

外来化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	TPF療法
診療科	耳鼻咽喉科
診療科責任者	
申請者名	
適応	頭頸部がん
登録年月日	2010.06.28(2017.07.15改定)

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ドセタキセル	div	75mg/m ²
シスプラチン	div	75mg/m ²
5-FU	div	750mg/m ²

投与スケジュール: 4週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール (Day 1-28)																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	フィジオ140 1000mL+ソリタT3 500mL	div 15hr	●																												
②	パロノセトロン0.75mg+デキサート9.9mg+硫酸Mg 20mL+生食100mL	div 30min		●																											
③	ドセタキセル()mg+5%ブドウ糖 250mL	div 75min		●																											
④	シスプラチン()mg+生食 250mL	div 2hr		●																											
⑤	生食20mL	iv		●																											
⑥	マンニトール 300mL	div 1hr		●																											
⑦	生食20mL	iv		●																											
⑧	5-FU()mg+ソリアセトF 1000mL+ソリタT3 500mL	div 20hr		●																											
⑨	フィジオ140 1000mL (⑧の5-FUと同時に開始、側管から)	div 4hr		●																											
⑩	5-FU()mg+ソリアセトF 1000mL+ソリタT3 500mL	div 24hr			●	●	●	●																							
⑪	メクロプラミド10mg+デキサート6.6mg+生食100mL (⑩と同時に開始。側管から)	div 30min			●	●	●	●																							
⑫	フィジオ140 1000mL (⑪終了後開始、側管から)	div 4hr			●	●	●	●																							
⑬	フィジオ140 1000mL+ソリタT3 500mL	div 8hr							●	●																					

アプレピタントカプセルセット(DAY1-3)
アプレピタントカプセル80mg(DAY4-5)は別途処方にて対

外来化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	オブジーボ療法
診療科	耳鼻咽喉科
診療科責任者	
申請者名	
適応	頭頸部がん
登録年月日	2017.10.2

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オブジーボ	div	240mg

投与スケジュール： 1クール14日

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ポララミン5mg+生食50mL	div 15min		●																											
②	生食50mL (フラッシング)	div 15min		●																											
③	オブジーボ点滴静注240mg+生食100mL ※0.2又は0.22μ mのインラインフィルターを使用	div 30min		●																											
④	生食50mL (フラッシング)	div 15min		●																											

開始予定日 あり 年 月 日 なし

外来化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	FP+C-mab
診療科	腫瘍内科
診療科責任者	
申請者名	
適応	頭頸部がん
登録年月日	2018.5.2

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
セツキシマブ(初回)	div	400mg/m ²
セツキシマブ(2回目以降)	div	250mg/m ²
シスプラチン	div	100mg/m ²
5-FU	civ	1000mg/m ²

投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ハロ/セトロン0.75mg+デキサト注9.9mg+生食100mL	div 30min		●																											
	デキサト注6.6mg+生食50mL(側管から)	div 30min			●	●	●				●							●													
	生食1000mL+ソリタT3 500mL(側管から)	div 12hr			●	●																									
	生食1000mL+硫酸Mg20mL+KCL20mL	div 2hr		●																											
	ポララミン5mg+生食50mL	div 15min		●							●							●													
	セツキシマブ()mg+生食250mL(2回目以降1時間)	div 2hr		●							●							●													
	生食50mL	div 30min		●																											
	20%マンニトール 300mL	div 45min		●																											
	シスプラチン()mg+生食500mL(Total 500mL)	div 2hr		●																											
	5-FU()mg+生食250mL	div 24hr		●	●	●	●																								
	生食500mL(側管から)	div 6hr		●																											
	生食50mL(フラッシュ用)	div 15min						●			●							●													

アプレピタントカプセルセット別途処方
(1日目から3日間内服)
シスプラチンによる吐き気予防

