

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	SOX療法(大腸癌)
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	20160415

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オキサリプラチン	div	130mg/m <sup>2</sup>
TS-1	po	※1

※TS-1投与量表

体表面積	<1.25	1.25~1.5	1.5≦
投与量(1回量)	40mg	50mg	60mg

投与スケジュール: 3週毎投与(TS-1は初日より2週間投与)

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセトロンバッグ3mg 100mL+デキサート4.95mg	div 30min		●																											
②	オキサリプラチン( )mg+ 5% ブドウ糖 500mL	div 2hr		●																											
	TS-1( )mg	po		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
			・イメントカプセルセット(DAY1-3)内服 ・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用														※1クール21日となります(枠内)														

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	SOX+BV療法
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	20160415

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オキサリプラチン	div	130mg/m <sup>2</sup>
TS-1	po	40~60mg/回 × 2
BV	div	7.5mg/kg

投与スケジュール: 3週毎投与(TS-1は初日より2週間投与)

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセトロンバッグ3mg 100mL+デキササート4.95mg	div 30min		●																											
②	アバスチン( )mg + 生食 100ml	div 30~90min		●																											
③	生食100mL	div		●																											
④	オキサリプラチン( )mg+ 5% ブドウ糖 500mL	div 2hr		●																											
	TS-1( )mg	po		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
			イメドカプセルセット(DAY1-3)内服 デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用														※1クール21日となります(枠内)														

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	アバスチン+m-FOLFOX
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2007.10.04

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オキサリプラチン	div	85mg/m <sup>2</sup>
レボホリナート	div	200mg/m <sup>2</sup>
5-FU(bolus)	div(全開)	400mg/m <sup>2</sup>
5-FU	civ	2400mg/m <sup>2</sup>
アバスチン	div	5mg/kg

## 投与スケジュール: 2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	プロイメンド150mg+デキサート4.95mg+生食100mL	div 30min		●																											
②	グラニセトロンバッグ3mg 100mL	div 30min		●																											
③	アバスチン( )mg + 生食 100ml	div 90-30min		●																											
④	生食 100ml フラッシュ用	div		●																											
⑤	オキサリプラチン( )mg+5%ブドウ糖 250ml	div 2hr		●																											
⑥	レボホリナート( )mg+5%ブドウ糖 250ml ⑤と同時に	div 2hr		●																											
⑦	5-FU( )mg+生食 50ml ⑤⑥終了後 bolus	div 全開		●																											
⑧	5-FU( )mg+生食加えて全量230ml インフューザーより (5ml/hr)	civ 46hr		●																											
				・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用																											

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	アバスチン+FOLFIRI療法
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2007.10.04

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
イリノテカン	div	150mg/m <sup>2</sup>
レボホリナート	div	200mg/m <sup>2</sup>
5-FU(bolus)	div(全開)	400mg/m <sup>2</sup>
5-FU	civ	2400mg/m <sup>2</sup>
アバスチン	div	5mg/kg

投与スケジュール: 2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール: 2週毎投与																													
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
①	プロイメンド150mg+デキサート4.95mg+生食100mL	div 30min		●																												
②	グラニセトロンバッグ3mg 100mL	div 30min		●																												
③	アバスチン( )mg + 生食 100ml	div 90min		●																												
④	生食 100ml フラッシュ用	div		●																												
⑤	イリノテカン( )mg+5%ブドウ糖 250ml	div 2hr		●																												
⑥	レボホリナート( )mg+5%ブドウ糖 250ml ⑤と同時に	div 2hr		●																												
⑦	5-FU( )mg+生食 50ml ⑤⑥終了後 bolus	div 全開		●																												
⑧	5-FU( )mg+生食加えて全量230ml インフューザーより (5ml/hr)	civ 46hr		●																												

・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用

開始予定日 あり     年     月     日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	FOLFIRI療法
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	20160414

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
イリノテカン	div	150mg/m <sup>2</sup>
レボホリナート	div	200mg/m <sup>2</sup>
5-FU(bolus)	div(全開)	400mg/m <sup>2</sup>
5-FU	civ	2400mg/m <sup>2</sup>

## 投与スケジュール: 2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																													
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
①	プロイメンド150mg+デキサート4.95mg+生食100mL	div 30min		●																												
②	グラニセトンバッグ3mg 100mL	div 30min		●																												
③	イリノテカン( )mg+5%ブドウ糖 250ml	div 2hr		●																												
③	レボホリナート( )mg+5%ブドウ糖 250ml イリノテカンと同時に	div 2hr		●																												
④	5-FU( )mg+生食 50ml ③終了後 bolus	div 全開		●																												
⑤	5-FU( )mg+生食加えて全量230ml インフューザーより (5ml/hr)	civ 46hr		●																												

・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	m-FOLFOX 6療法
診療科	腫瘍内科
適応	大腸・胃がん
登録年月日	20160414

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オキサリプラチン	div	85mg/m <sup>2</sup>
レボホリナート	div	200mg/m <sup>2</sup>
5-FU(bolus)	div(全開)	400mg/m <sup>2</sup>
5-FU	civ	2400mg/m <sup>2</sup>

## 投与スケジュール: 2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	プロイメンド150mg+デキサート4.95mg+生食100mL	div 30min		●																											
②	グラニセトンバッグ3mg 100mL	div 30min		●																											
③	オキサリプラチン( )mg+5%ブドウ糖 250ml	div 2hr		●																											
③	レボホリナート( )mg+5%ブドウ糖 250ml オキサリプラチンと同時に	div 2hr		●																											
④	5-FU( )mg+生食 50ml ③終了後 bolus	div 全開		●																											
⑤	5-FU( )mg+生食加えて全量230ml インフューザーより (5ml/hr)	civ 46hr		●																											
				・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用																											

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	アービタックス+FOLFOX
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	20160414

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
アービタックス(初回)	div(2hr)	400mg/m <sup>2</sup>
アービタックス(2回目以降)	div(1hr)	250mg/m <sup>2</sup>
オキサリプラチン	div	85mg/m <sup>2</sup>
レボホリナート	div	200mg/m <sup>2</sup>
5-FU(bolus)	div(全開)	400mg/m <sup>2</sup>
5-FU	civ	2400mg/m <sup>2</sup>

## 投与スケジュール: 2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
①	プロイメンド150mg+デキサート4.95mg+生食100mL	div 30min		●																												
①	デキサート注6.6mg+生食100mL	div 30min									●																					
②	グラニセトンバッグ3mg 100mL	div 30min		●																												
③	ホラミン5mg+生食50mL	div 15min		●							●																					
④	アービタックス( )mg+生食( )ml ※Total 250mlにする。	div 1or2hr		●							●																					
⑤	生食 100ml フラッシュ用	div 1hr		●							●																					
⑥	オキサリプラチン( )mg+5%ブドウ糖 250ml	div 2hr		●																												
⑦	レボホリナート( )mg+5%ブドウ糖 250ml ⑥と同時に	div 2hr		●																												
⑧	5-FU( )mg+生食 50ml ⑥⑦終了後 bolus	div 全開		●																												
⑨	5-FU( )mg+生食加えて全量230ml インフューザーより (5ml/hr)	civ 46hr		●																												

デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	アービタックス+FOLFIRI
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	20160414

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
アービタックス(初回)	div(2hr)	400mg/m <sup>2</sup>
アービタックス(2回目以降)	div(1hr)	250mg/m <sup>2</sup>
イリノテカン	div	150mg/m <sup>2</sup>
レボホリナート	div	200mg/m <sup>2</sup>
5-FU(bolus)	div(全開)	400mg/m <sup>2</sup>
5-FU	civ	2400mg/m <sup>2</sup>

投与スケジュール: 1コース14日

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																													
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
①	プロイメンド150mg+デキサート4.95mg+生食100mL	div 30min		●																												
①	デキサート注6.6mg+生食100mL	div 30min									●																					
②	グラニセトロンバッグ3mg 100mL	div 30min		●																												
③	ホラミン5mg+生食50mL	div 15min		●							●																					
④	アービタックス( )mg+生食( )ml ※Total 250mlにする。	div 1or2hr		●							●																					
⑤	生食 100ml フラッシュ用	div 1hr		●							●																					
・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用																																
⑥	イリノテカン( )mg+5%ブドウ糖 250ml	div 2hr		●																												
⑦	レボホリナート( )mg+5%ブドウ糖 250ml ⑥と同時に	div 2hr		●																												
⑧	5-FU( )mg+生食 50ml ⑥⑦終了後 bolus	div 全開		●																												
⑨	5-FU( )mg+生食加えて全量230ml インフューザーより (5ml/hr)	civ 46hr		●																												

開始予定日 あり 年 月 日 なし



# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	ベクティビックス+FOLFIRI
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2016.06.13

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ベクティビックス	div	6mg/kg
イリノテカン	div	150mg/m <sup>2</sup>
レボホリナート	div	200mg/m <sup>2</sup>
5-FU(bolus)	div(全開)	400mg/m <sup>2</sup>
5-FU	civ	2400mg/m <sup>2</sup>

投与スケジュール: 2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	プロイメンド150mg+デキサート4.95mg+生食100mL	div 30min		●																											
②	グラニセトロンバッグ3mg 100mL	div 30min		●																											
③	ベクティビックス( )mg+生食 100ml ※Total 100mlにする。	div 1hr		●																											
④	生食 100ml フラッシュ用	div 1hr		●																											
⑤	イリノテカン( )mg+5%ブドウ糖 250ml	div 2hr		●																											
⑥	レボホリナート( )mg+5%ブドウ糖 250ml ⑤と同時に	div 2hr		●																											
⑦	5-FU( )mg+生食 50ml ⑤⑥終了後 bolus	div 全開		●																											
⑧	5-FU( )mg+生食加えて全量230ml インフューザーより (5ml/hr)	civ 46hr		●																											

デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	ベクティビックス+m-FOLFOX 6
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2016.06.13

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ベクティビックス	div	6mg/kg
オキサリプラチン	div	85mg/m <sup>2</sup>
レボホリナート	div	200mg/m <sup>2</sup>
5-FU(bolus)	div(全開)	400mg/m <sup>2</sup>
5-FU	civ	2400mg/m <sup>2</sup>

## 投与スケジュール: 2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	プロイメンド150mg+デキサート4.95mg+生食100mL	div 30min		●																											
②	グラニセトロンバッグ3mg 100mL	div 30min		●																											
③	ベクティビックス( )mg+生食 100mL ※Total 100mLにする。	div 1hr		●																											
④	生食 100mL フラッシュ用	div		●																											
⑤	オキサリプラチン( )mg+5%ブドウ糖 250mL	div 2hr		●																											
⑥	レボホリナート( )mg+5%ブドウ糖 250mL ⑤と同時に	div 2hr		●																											
⑦	5-FU( )mg+生食 50mL ⑤⑥終了後 bolus	div 全開		●																											
⑧	5-FU( )mg+生食加えて全量230mL インフューザーより (5ml/hr)	civ 46hr		●																											

・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	ベクティビックス+CPT-11
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2016.06.13(2017.07.28改定)

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ベクティビックス	div	6mg/kg
イリノテカン	div	150mg/m <sup>2</sup>

## 投与スケジュール：2週毎

投与順	+	経路・時間	投与スケジュール																																							
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
①	グラニセロンハッグ3mg+デキサート4.95mg	div 30min		●																																						
②	ベクティビックス( )mg+生食 100ml ※Total 100mlにする。	div 1hr		●																																						
③	生食 100ml フラッシュ用	div 1hr		●																																						
④	イリノテカン( )mg+生食 500ml	div 2hr		●																																						

・イメンドカプセル125mg DAY1  
80mg DAY2-3 に服用  
・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	ベクティビックス単剤
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2016.06.13

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ベクティビックス	div	6mg/kg

## 投与スケジュール: 2週毎

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール: 2週毎																														
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
①	デキサート(6.6mg)1A+生食100mL	div 30min		●																													
②	ベクティビックス( )mg+生食 100ml ※Total 100mlにする。	div 1hr		●																													
③	生食 100ml フラッシュ用	div 1hr		●																													

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	XELOX療法
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2016.06.13

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オキサリプラチン	div	130mg/m <sup>2</sup>
ゼローダ錠	po	1000mg/m <sup>2</sup> /回

投与スケジュール: 3週間毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセロンバック3mg+デキサート4.95mg	div 30min		●																											
②	オキサリプラチン( )mg+5%ブドウ糖 500ml	div 120min		●																											
③	ゼローダ錠300 ( )mg	po 分2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														

・イメドカプセルセット(DAY1-3)内服  
 ・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	XELOX+アバスチン
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2016.06.13

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
アバスチン	div	7.5mg/kg
オキサリプラチン	div	130mg/m <sup>2</sup>
ゼローダ錠	po	注1

注1): ①1.36m<sup>2</sup>未満: 1200mg ②1.36m<sup>2</sup>~1.66m<sup>2</sup>: 1500mg ③1.66m<sup>2</sup>~1.96m<sup>2</sup>: 1800mg ④1.96m<sup>2</sup>以上: 2100mg

## 投与スケジュール: 3週間毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセロンバック3mg+デキサート4.95mg	div 30min		●																											
②	アバスチン( )mg + 生食 100ml	div 30~90min		●																											
③	生食100mL	div		●																											
④	オキサリプラチン( )mg+5%ブドウ糖 500ml	div 2hr		●																											
⑤	ゼローダ錠300 ( )mg	po 分2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														

・イメドカプセルセット(DAY1-3)内服  
 ・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	アービタックス単剤
診療科	内科・消化器科
適応	大腸がん
登録年月日	20160414

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
アービタックス(初回)	div(2hr)	400mg/m <sup>2</sup>
アービタックス(2回目以降)	div(1hr)	250mg/m <sup>2</sup>

## 投与スケジュール: 週1回投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	デキサト注(6.6mg)1A+生食100mL	div 30min		●																											
②	ホラミン5mg+生食50mL	div 15min		●																											
③	アービタックス( )mg+生食( )ml ※Total 250mlにする。	div 1or2hr		●																											
④	生食 100ml フラッシュ用	div 1hr		●																											

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	アービタックス(毎週)+GPT11(2週毎)
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	20160414(20170728改定)

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
アービタックス(初回)	div(2hr)	400mg/m <sup>2</sup>
アービタックス(2回目以降)	div(1hr)	250mg/m <sup>2</sup>
イリノテカン	div	150mg/m <sup>2</sup>

投与スケジュール: アービタックス毎週投与、イリノテカン2週間隔投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	~	8	~	15	~	22	~	29	~	36	~	43	~																							
①	グラニセロンハッグ3mg+デキサート4.95mg	div 30min		●				●																																
①	デキサート6.6mg+生食100mL	div 30min				●				●																														
②	ホラミン5mg+生食50mL	div 15min		●		●		●		●																														
③	アービタックス( )mg+生食( )ml ※Total 250mlにする。	div 初回2hr 2回目以降1hr		●		●		●		●																														
④	生食 100ml フラッシュ用	div 1hr		●		●		●		●																														
⑤	イリノテカン( )mg+生食 500ml	div 2hr		●				●																																

DAY1と15  
 ・イメドカプセル125mg DAY1  
                                   80mg DAY2-3 に服用  
 ・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用

開始予定日 あり 年 月 日 なし



# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	XELIRI+BEV療法
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2016.07.26

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ベバシズマブ	div	7.5mg/kg
イリノテカン	div	200mg/m <sup>2</sup>
カペシタビン	po	1600mg/m <sup>2</sup>

投与スケジュール: 3週間毎投与

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																													
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
①	アバステン(7.5mg/kg)+生食100mL	div 30min		●																												
②	生食100mL	div		●																												
③	アロキシ0.75mg+デキサート6.6mg+生食100mL	div 30min		●																												
④	イリノテカン(200mg/m <sup>2</sup> ) + 5%ブドウ糖500mL	div 90min		●																												
⑤	生食50mL	div 15min		●																												
	ゼローダ錠300 ( )mg	po 分2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
	イメンドカプセルセットは別途処方願います																															

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	SIRB療法
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2016.09.14(2017.7.28改定)

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
イリノテカン	div	150mg/m <sup>2</sup>
ベバシズマブ	div	7.5mg/kg
S-1	po	

## 投与スケジュール: 3週間毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセロンパッグ3mg+デキサート4.95mg	div 30min		●																											
②	アバステン(7.5mg/kg)+生食100mL	div 30min		●																											
③	生食100mL	div 30min		●																											
④	イリノテカン(150mg/m <sup>2</sup> ) + 5%ブドウ糖500mL	div 90min		●																											
	S-1 ( )mg	po 分2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
			・イメドカプセル125mg DAY1 80mg DAY2-3 に服用 ・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用																												

し

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	IRIS療法
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん、大腸がん
登録年月日	20160613

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
イリノテカン	div	125mg/m <sup>2</sup>
TS-1	po	40~60mg/回×2

※TS-1投与量表

体表面積	<1.25	1.25~1.5	1.5≦
投与量(1回量)	40mg	50mg	60mg

投与スケジュール: 2週毎投与(TS-1は初日より2週間投与)

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセロンハック3mg+デキサート4.95mg	div 30min		●														●													
②	イリノテカン( )mg+ 5% ブドウ糖 500ml	div 1.5hr		●														●													
③	TS-1( )mg	po		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
																		※1クール28日となります(枠内)													
																		・イメドカプセル125mg DAY1 80mg DAY2-3 に服用 ・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用													

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	IRIS+BEV療法
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2011.03.04(2017.7.28改定)

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
イリノテカン	div	100mg/m <sup>2</sup>
アバステン	div	5mg/kg
TS-1	po	80~120mg/2×

### ※TS-1投与量表

体表面積	<1.25	1.25~1.5	1.5≤
投与量(1回量)	40mg	50mg	60mg

### 投与スケジュール: 2週毎投与(TS-1は初日より2週間投与)

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセロンバッグ3mg+デキサート4.95mg	div 30min		●														●													
②	アバステン( )mg + 生食 100ml	div 30~90min		●														●													
③	生食 100ml フラッシュ用	div 1hr		●														●													
④	イリノテカン( )mg + 5% ブドウ糖 500ml	div 1.5hr		●														●													
⑤	TS-1( )mg	po		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
																			※1クール28日となります(枠内)												
																			・イメンドカプセル125mg DAY1 80mg DAY2-3 に服用 ・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用												

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	FOLFIRI+サイラムザ療法
診療科	消化器内科
適応	大腸がん
登録年月日	2016.09.15

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ラムシルマブ	div	8mg/kg
イリノテカン	div	180mg/m <sup>2</sup>
レボホリナート	div	200mg/m <sup>2</sup>
5-FU(bolus)	div(全開)	400mg/m <sup>2</sup>
5-FU	civ	2400mg/m <sup>2</sup>

## 投与スケジュール: 2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ポララミン5mg+生食50mL	div 15min		●																											
②	サイラムザ(8mg/kg)+生食250mL	div 1hr		●																											
③	プロイメンド150mg+テキサト注4.95mg+生食100mL	div 30min		●																											
④	グラニセトロンバッグ3mg	div 30min		●																											
⑤	イリノテカン(150mg/m <sup>2</sup> )mg+5%ブドウ糖 250ml	div 2hr		●																											
⑤	レボホリナート(200mg/m <sup>2</sup> )mg+5%ブドウ糖 250ml	div 2hr		●																											
⑥	5-FU( )mg+生食 50ml	div 全開		●																											
⑦	5-FU( )mg+生食加えて全量230ml インフューザーより(5ml/hr)	civ 46hr		●																											
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     ・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用                 </div>																												









# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	FOLFOXIRI+BEV
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2016.12.1

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
アバスチン	div	5mg/kg
オキサリプラチン	div	85mg/m <sup>2</sup>
イリノテカン	div	150mg/m <sup>2</sup>
レボホリナート	div	200mg/m <sup>2</sup>
5-FU	civ	2400mg/m <sup>2</sup>

投与スケジュール: 2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
①	プロイメンド150mg+デキサート9.9mg+生食100mL	div 30min		●																												
②	アロキシ0.75mg+生食100mL	div 30min		●																												
③	アバスチン( )mg+生食100mL	div 90~30min		●																												
④	イリノテカン( )mg+5%ブドウ糖 250ml	div 90min		●																												
⑤	オキサリプラチン( )mg+5%ブドウ糖 250ml	div 2hr		●																												
⑥	レボホリナート( )mg+5%ブドウ糖 250ml ④終了後⑤と同時に	div 2hr		●																												
⑦	5-FU( )mg+生食加えて全量230ml インフューザーより (5ml/hr)	civ 46hr		●																												
			デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用																													

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	TAS102+BEV療法
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2017.10.26

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
TAS-102	po	35mg/m <sup>2</sup>
アバスチン	div	5mg/kg

## 投与スケジュール: 4週毎

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
①	アバスチン( )mg + 生食 100ml	div 30~90min		●														●																		
②	生食 50ml	div フラッシュ用		●														●																		
③	ロンサーフ	po		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●																					
																		※1クール28日となります(枠内)																		

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	UFT/LV+BEV
診療科	消化器内科
適応	大腸がん
登録年月日	R1.7.22

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
UFT	po	300mg/m <sup>2</sup> /DAY 分3
LV	po	75mg/DAY 分3
ベバシズマブ	div	5mg/kg

## 投与スケジュール: 4週毎

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	アバステン( )mg + 生食 100ml	div 30~90min		●														●													
②	生食 50ml	div フラッシュ用		●														●													
③	UFT/LV	po		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

※1クール28日となります(枠内)

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	CPT-11+CDDP療法
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	2016.07.26

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
イリノテカン	div	70mg/m <sup>2</sup>
シスプラチン	div	80mg/m <sup>2</sup>

## 投与スケジュール: 4週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg+生食100mL	div 30min		●																											
①	アロキシ0.75mg+デキサート4.95mg+生食100mL	div 30min																●													
②	イリノテカン( )mg+5%ブドウ糖250mL	div 90min		●														●													
③	生食1000mL+硫酸Mg20mL+KCL20mL	div 2hr		●																											
④	20%マンニトール 300mL	div 45min		●																											
⑤	シスプラチン 80mg/m <sup>2</sup> +生食 500ml	div 2hr		●																											
⑥	生食500mL	div 6hr		●																											
⑦	デキサート注(6.6mg)+生食50ml	div 30min			●	●	●																								
⑨	生食1000mL+ソリタT3 500mL	div 12hr			●	●																									
⑩	生食50mL(側管から)	div 30min					●											●													

イメドカプセルセット別途処方(DAY1と15)  
DEX4mg (DAY16-18分)別途処方

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	SP+HER療法
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	20160414

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
TS-1(S-1)	po	80mg/m <sup>2</sup> (分2)
シスプラチン	div	60mg/m <sup>2</sup>
ハーセプチン	div	6mg/kg (初回8mg/kg)

## 投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	~	35
①	アロキシ0.75mg+デキサト注9.9mg+生食100mL	div 30min		●																										
②	生食1000mL+硫酸Mg補正液20mL+KCL20mL	div 2hr		●																										
③	ハーセプチン( )mg+生食 250mL	div 90min以上		●																										
④	20%マンニトール300mL	div 45min		●																										
⑤	シスプラチン 60mg/m <sup>2</sup> +生食 500ml	div 2hr		●																										
⑥	生食500mL	div 6hr		●																										
⑦	デキサト注(6.6mg)+生食50ml	div 30min			●	●	●																							
⑧	生食1000mL+ソリタT3号 500ml	div 12hr			●	●																								
	TS-1 80mg/m <sup>2</sup>	po 分2(朝・夕)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													

・イメドカプセル125mg DAY1  
80mg DAY2-3 に服用

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	XP(ゼローダ+CDDP)療法
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	20160414

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ゼローダ	経口	1000mg/m <sup>2</sup>
シスプラチン	div	80mg/m <sup>2</sup>

## 投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	プロイメンド150mg+デキサート9.9mg+生食250mL	div 1hr		●																											
②	アロキシ0.75mg+生食100mL	div 30min		●																											
③	生食1000mL+硫酸Mg補正液20mL+KCL20mL	div 2hr		●																											
④	20%マンニトール300mL	div 45min		●																											
⑤	シスプラチン 60mg/m <sup>2</sup> +生食 500ml	div 2hr		●																											
⑥	生食500mL	div 6hr		●																											
⑦	デキサート注(6.6mg)+生食50ml	div 30min			●																										
⑦	デキサート注(13.2mg)+生食50ml	div 30min				●	●																								
⑧	生食1000mL+ソリタT3号 500ml	div 12hr			●	●																									
	ゼローダ	po 分2(朝・夕)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	XP+HER療法(イメト)
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	20160414

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ゼローダ	po	1000mg/m <sup>2</sup>
シスプラチン	div	80mg/m <sup>2</sup>
ハーセプチン	div	6mg/kg (初回8mg/kg)

## 投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	~	35
①	アロキシ0.75mg+デキサト注9.9mg+生食100mL	div 30min		●																										
②	生食1000mL+硫酸Mg補正液20mL+KCL20mL	div 2hr		●																										
③	ハーセプチン( )mg+生食 250mL	div 90min以上		●																										
④	20%マンニトール300mL	div 45min		●																										
⑤	シスプラチン 60mg/m <sup>2</sup> +生食 500ml	div 2hr		●																										
⑥	生食500mL	div 6hr		●																										
⑦	デキサト注(6.6mg)+生食50ml	div 30min			●	●	●																							
⑧	生食1000mL+ソリタT3号 500ml	div 12hr			●	●																								
	ゼローダ	po 分2(朝・夕)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													

・イメドカプセル125mg DAY1  
80mg DAY2-3 に服用  
・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	XP+HER療法(プロイメント)
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	20160414

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ゼローダ	po	1000mg/m <sup>2</sup>
シスプラチン	div	80mg/m <sup>2</sup>
ハーセプチン	div	6mg/kg (初回8mg/kg)

**投与スケジュール: 3週毎投与**

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール: 3週毎投与																																	
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	~	35						
①	プロイメント150mg+デキサート9.9mg+生食250mL	div 1hr		●																																
②	アロキシ0.75mg+生食100mL	div 30min		●																																
③	生食1000mL+硫酸Mg補正液20mL+KCL20mL	div 2hr		●																																
④	ハーセプチン( )mg+生食 250mL	div 90min以上		●																																
⑤	20%マンニトール300mL	div 45min		●																																
⑥	シスプラチン 60mg/m <sup>2</sup> +生食 500ml	div 2hr		●																																
⑦	生食500mL	div 6hr		●																																
⑧	デキサート注(6.6mg)+生食50ml	div 30min			●																															
⑧	デキサート注(13.2mg)+生食50ml	div 30min				●	●																													
⑨	生食1000mL+ソリタT3号 500ml	div 12hr			●	●																														
ゼローダ		po 分2(朝・夕)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

開始予定日 あり 年 月 日 なし



# 外来化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	FP+HER療法(胃)(イメドカプセル)
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	20160421

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
5-FU	civ	800mg/m <sup>2</sup>
シスプラチン	div	80mg/m <sup>2</sup>
トラスツズマブ(初回)	div	8mg/kg
トラスツズマブ(2回目以降)	div	6mg/kg

## 投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg+生食100mL	div 30min		●																											
②	生食1000mL+硫酸Mg20mL+KCL20mL	div 2hr		●																											
③	ハーセプチン( )mg+生食250mL(2回目以降30分)	div 1.5hr		●																											
④	生食50mL(側管から)	div 15min		●																											
⑤	5-FU( )mg+生食250mL	div 24hr		●	●	●	●	●																							
⑥	20%マンニトール 300mL	div 45min		●																											
⑦	シスプラチン( )mg+生食500mL(Total 500mL)	div 2hr		●																											
⑧	生食500mL	div 6hr		●																											
⑨	デキサート注6.6mg+生食50mL	div 30min			●	●	●	●																							
⑩	生食1000mL+ソリタT3 500mL	div 12hr			●	●																									
⑪	生食50mL(側管から)	div 30min							●																						

イメドカプセルセット別途処方

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	SP療法
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	2016.06.13

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
TS-1(S-1)	po	80mg/m <sup>2</sup> (分2)
シスプラチン	div	60mg/m <sup>2</sup>

## 投与スケジュール: 5週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																																		
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	~	35							
①	アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg+生食250mL	div 1hr										●																									
②	生食1000mL+硫酸Mg補正液20mL+KCL20mL	div 2hr										●																									
③	20%マンニトール300mL	div 45min										●																									
④	シスプラチン 60mg/m <sup>2</sup> +生食 500ml	div 2hr										●																									
⑤	生食500mL	div 6hr										●																									
⑥	デキサート注(6.6mg)+生食50ml	div 30min											●	●	●																						
⑦	生食1000mL+ソリタT3号 500ml	div 12hr											●	●																							
	TS-1 80mg/m <sup>2</sup>	po 分2(朝・夕)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	SP+HER療法
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	20160414

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
TS-1(S-1)	po	80mg/m <sup>2</sup> (分2)
シスプラチン	div	60mg/m <sup>2</sup>
ハーセプチン	div	6mg/kg (初回8mg/kg)

投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	~	35
①	プロイメンド150mg+デキサート9.9mg+生食250mL	div 1hr									●																			
②	アロキシ0.75mg+生食100mL	div 30min									●																			
③	生食1000mL+硫酸Mg補正液20mL+KCL20mL	div 2hr									●																			
④	ハーセプチン( )mg+生食 250mL	div 90min以上									●																			
⑤	20%マンニトール300mL	div 45min									●																			
⑥	シスプラチン 60mg/m <sup>2</sup> +生食 500ml	div 2hr									●																			
⑦	生食500mL	div 6hr									●																			
⑧	デキサート注(6.6mg)+生食50ml	div 30min										●																		
⑧	デキサート注(13.2mg)+生食50ml	div 30min											●	●																
⑨	生食1000mL+ソリタT3号 500ml	div 12hr										●	●																	
	TS-1 80mg/m <sup>2</sup>	po 分2(朝・夕)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	SOX療法(胃癌)
診療科	消化器内科
適応	胃がん
登録年月日	20150620

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オキサリプラチン	div	100mg/m <sup>2</sup>
TS-1	po	40~60mg/回×2

※TS-1投与量表

体表面積	<1.25	1.25~1.5	1.5≧
投与量(1回量)	40mg	50mg	60mg

投与スケジュール: 3週毎投与(TS-1は初日より2週間投与)

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセトロンバッグ3mg 100mL+デキサート4.95mg	div 30min		●																											
②	オキサリプラチン( )mg+ 5% ブドウ糖500mL	div 2hr		●																											
	TS-1( )mg	po		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                     ・イメドカプセルセット(DAY1-3)内服                      ・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用                 </div>																												

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 外来化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	DCF療法(イメド)
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	2016.10.11

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ドセタキセル	div	75mg/m <sup>2</sup>
シスプラチン	div	75mg/m <sup>2</sup>
5-FU	div	750mg/m <sup>2</sup>

投与スケジュール:4週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																												
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	アロキシ0.75mg+デキサート注9.9mg+生食100mL	div 30min		●																											
①	デキサート注6.6mg+生食100mL(側管から)	div 30min			●	●	●	●																							
②	生食1000mL+ソリタT3 500mL(側管から)	div 12hr			●	●																									
②	生食1000mL+硫酸Mg20mL+KCL20mL	div 2hr		●																											
③	ドセタキセル注+生食250mL	div 1hr		●																											
④	マンニトール300mL	div 45min		●																											
⑤	シスプラチン( )mg+生食500mL(Total 500mL)	div 2hr		●																											
⑥	5-FU( )mg+生食250mL	div 24hr		●	●	●	●	●																							
⑦	生食500mL(側管から)	div 6hr		●																											
⑧	生食50mL(側管から)	div 6hr								●																					

イメドカプセルセット別途処方



# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	FP療法(胃)(プロイメド <sup>ver</sup> )
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	2016.06.13

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
5-FU	div	800mg/m <sup>2</sup>
シスプラチン	div	80mg/m <sup>2</sup>

## 投与スケジュール: 4週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	プロイメド150mg+デキサート9.9mg+生食250mL	div 1hr		●																											
①	生食1000mL+ソリタT3 500mL	div 12hr			●	●																									
②	アロキシ0.75mg+生食100mL	div 30min		●																											
②	デキサート注(6.6mg)+生食50ml	div 30min			●																										
②	デキサート注(13.2mg)+生食50ml	div 30min				●	●	●																							
③	生食1000mL+硫酸Mg20mL+KCL20mL	div 2hr		●																											
④	5-FU( )mg+生食250mL	div 24hr		●	●	●	●	●																							
⑤	20%マンニトール 300mL	div 45min		●																											
⑥	シスプラチン 80mg/m <sup>2</sup> +生食 500ml	div 2hr		●																											
⑦	生食500mL(側管から)	div 6hr		●																											
⑧	生食50mL	div 30min							●																						

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	FP療法(胃)(イメド <sup>®</sup> ver)
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	2016.06.13

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
5-FU	div	800mg/m <sup>2</sup>
シスプラチン	div	80mg/m <sup>2</sup>

投与スケジュール: 4週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg+生食100mL	div 30min		●																											
①	生食1000mL+ソリタT3 500mL	div 12hr			●	●																									
②	デキサート注(6.6mg)+生食50ml	div 30min			●	●	●	●																							
②	生食1000mL+硫酸Mg20mL+KCL20mL	div 2hr		●																											
③	5-FU( )mg+生食250mL	div 24hr		●	●	●	●	●																							
④	20%マンニトール 300mL	div 45min		●																											
⑤	シスプラチン 80mg/m <sup>2</sup> +生食 500ml	div 2hr		●																											
⑦	生食500mL(側管から)	div 6hr		●																											
⑧	生食50mL	div 30min							●																						

イメド<sup>®</sup>カプセルセットは別途処方

開始予定日 あり 年 月 日 なし



# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	CPT-11(2週毎)
診療科	内科
適応	胃がん
登録年月日	2010.11.25

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
イリノテカン	div	150mg/m2

## 投与スケジュール: 2週毎

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセトロン3mgバッグ+デキサート4.95mg	div 30min		●														●													
②	イリノテカン( )mg+5%ブドウ糖 250mL	div 1.5hr		●														●													

・イメンドカプセル125mg DAY1  
80mg DAY2-3 に服用  
・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	XP(ゼローダ+CDDP)療法
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	20160414

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ゼローダ	経口	1000mg/m <sup>2</sup>
シスプラチン	div	80mg/m <sup>2</sup>

## 投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	アロキシ0.75mg+デキサト注9.9mg+生食100mL	div 30min		●																											
②	生食1000mL+硫酸Mg補正液20mL+KCL20mL	div 2hr		●																											
③	20%マンニトール300mL	div 45min		●																											
④	シスプラチン 60mg/m <sup>2</sup> +生食 500ml	div 2hr		●																											
⑤	生食500mL	div 6hr		●																											
⑥	デキサト注(6.6mg)+生食50ml	div 30min			●	●	●																								
⑦	生食1000mL+ソリタT3号 500ml	div 12hr			●	●																									
⑧	ゼローダ	po 分2(朝・夕)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														

・イメンドカプセル125mg DAY1  
80mg DAY2-3 に服用  
・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	DTX 単剤(胃)
診療科	内科
適応	胃がん
登録年月日	2007.02.05

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
DTX	div	60mg/m <sup>2</sup>

投与スケジュール: 3週毎に投与

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																					
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
②	デキサート6.6mg+ファモチジン20mg+グラニセトンパック3mg	div 30min		●																				
④	ドセタキセル( )mg+生食 250ml	div 2hr		●																				

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	アブラキサン療法(260mg/m <sup>2</sup> )
診療科	消化器内科
適応	胃がん
登録年月日	2014.11.19

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
アブラキサン	div	260mg/m <sup>2</sup> (注1)

投与スケジュール: 3週に1回投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	デキサート注6.6mg+生食50mL	div 15min		●																											
②	アブラキサン注(注1)mg+生食 <アブラキサン注 1Vあたり生食20mLで溶解>	div 30min		●																											

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	SOX療法(胃癌)
診療科	消化器内科
適応	胃癌
登録年月日	20150620

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オキサリプラチン	div	100mg/m <sup>2</sup>
TS-1	po	40~60mg/回×2

※TS-1投与量表

体表面積	<1.25	1.25~1.5	1.5≧
投与量(1回量)	40mg	50mg	60mg

投与スケジュール: 3週毎投与(TS-1は初日より2週間投与)

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
①	アロキシ0.75mg+デカドロン6.6mg+生食100mL	div 30min		●																																
②	オキサリプラチン( )mg+ 5% ブドウ糖 250mL	div 2hr		●																																
③	TS-1( )mg	po		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																			
																		※1クール21日となります(枠内)																		

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	サイラムザ単剤
診療科	消化器内科
適応	胃がん
登録年月日	2015.9.18

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
サイラムザ	div	8mg/kg

## 投与スケジュール: 1コース4週間

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ポララミン5mg+生食50mL	div 30min		●														●													
②	サイラムザ( )mg+生食250mL ※0.2又は0.22ミクロンの蛋白透過型フィルターを使用。	div 60min		●														●													
③	生食100mL ※1.2コース目(サイラムザ4回目まで)は60分かけて ※3コース以降(サイラムザ5回目以降)は全開投与。	div ※		●														●													

開始予定日 あり 年 月 日 なし



# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	FLTAX
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	20160530

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
5-FU	div	500mg/m <sup>2</sup>
PTX	div	60mg/m <sup>2</sup>

投与スケジュール: 3週投与1週休薬

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																														
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
①	デキサート6.6mg+ファモチジン20mg+生食50mL	div 30min		●																													
②	ポララミン5mg+生食50mL	div 30min		●																													
③	レボホリナート250mg/m <sup>2</sup> +生食250mL	div 2hr		●																													
④	5-FU 500mg/m <sup>2</sup> +生食50mL (レボホリナート投与開始1時間後に投与)	div 5min		●																													
⑤	PTX 60mg/m <sup>2</sup> +5%ブドウ糖250mL	div 1hr		●																													
⑥	生食50mL(フラッシュ用)	div 15min		●																													

開始予定日 あり 年 月 日 なし



# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	持続5-FU
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	20160531

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
5-FU	div	800mg/m <sup>2</sup>

## 投与スケジュール:1コース4週

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	デキサート6.6mg+生食100mL	div 30min		●	●	●	●	●																							
②	5-FU( )mg+ 生食500mL	div 24hr		●	●	●	●	●																							
③	生食50mL	div 15min							●																						

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	IRIS療法
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん、大腸がん
登録年月日	20160613

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
イリノテカン	div	125mg/m <sup>2</sup>
TS-1	po	40~60mg/回×2

※TS-1投与量表

体表面積	<1.25	1.25~1.5	1.5≦
投与量(1回量)	40mg	50mg	60mg

投与スケジュール: 2週毎投与(TS-1は初日より2週間投与)

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセロンハック3mg+デキサート4.95mg	div 30min		●														●													
②	イリノテカン( )mg+ 5% ブドウ糖 500ml	div 1.5hr		●														●													
③	TS-1( )mg	po		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
																		※1クール28日となります(枠内)													
																		・イメドカプセル125mg DAY1 80mg DAY2-3 に服用 ・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用													

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 外来化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	オブジーボ療法
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	2017.10.2

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オブジーボ	div	240mg

投与スケジュール： 1クール14日

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
①	ポララミン5mg+生食50mL	div 15min		●																														
②	生食50mL (フラッシング)	div 15min		●																														
③	オブジーボ点滴静注240mg+生食100mL ※0.2又は0.22μ mのインラインフィルターを使用	div 30min		●																														
④	生食50mL (フラッシング)	div 15min		●																														

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	nab-PTX療法(Weekly)
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	2017.10.2

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
アブラキサン	div	100mg/m <sup>2</sup> (注1)

## 投与スケジュール:3投1休

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセロンハック3mg+デキサト注6.6mg	div 30min		●							●							●													
②	アブラキサン注(注1)mg+生食 <アブラキサン注 1Vあたり生食20mLで溶解>	div 30min		●							●							●													

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	サイラムザ+nab-PTX
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	2018.2.9

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
サイラムザ	div	8mg/kg
nab-PTX	div	100mg/m <sup>2</sup>

投与スケジュール: 3週投与1週休薬

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセロンハック3mg+テキサート6.6mg+ホラミン5mg	div 30min		●														●													
①	グラニセロンハック3mg+テキサート6.6mg	div 30min									●																				
②	サイラムザ( )mg+生食250mL ※0.2又は0.22ミクロンの蛋白透過型フィルターを使用。	div 60min		●														●													
③	生食100mL ※1.2コース目(サイラムザ4回目まで)は60分かけて ※3コース以降(サイラムザ5回目以降)は全開投与。	div ※		●														●													
④	アブラキサン注(注1 )mg+生食 <アブラキサン注 1Vあたり生食20mLで溶解>	div 30min		●							●							●													
⑤	生食50mL(フラッシュ用)	div 急速静注		●							●							●													

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	サイラムザ+PTX
診療科	消化器内科
適応	胃がん
登録年月日	2015.9.18

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
サイラムザ	div	8mg/kg
PTX	div	80mg/m <sup>2</sup>

投与スケジュール: 3週投与1週休薬

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																															
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
①	デキサート6.6mg+ポララミン5mg+ファモチジン20mg+Ns100mL	div 30min		●																														
②	サイラムザ( )mg+生食250mL ※0.2又は0.22ミクロンの蛋白透過型フィルターを使用。	div 60min		●																														
③	生食100mL ※1.2コース目(サイラムザ4回目まで)は60分かけて ※3コース以降(サイラムザ5回目以降)は全開投与。	div ※		●																														
④	パクリタキセル( )mg+生食250mL	div 60min		●																														
⑤	生食50mL(フラッシュ用)	div 急速静注		●																														

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	内科 PTX 単剤
診療科	内科
適応	胃がん
登録年月日	2007.05.22

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
パクリタキセル	div	80mg/m <sup>2</sup>

投与スケジュール: 週1回 3週連続投与 4週目休み

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	デキサト6.6mg+ポララミン5mg+ファモチジン20mg+Ns100mL	div 30min		●							●							●													
②	パクリタキセル( )mg+生食 250ml	div 2hr		●							●							●													

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコル名	S-1+DTX(術後補助)
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん術後補助化学療法
登録年月日	2020.3.12

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
DTX	div	40mg/m <sup>2</sup>
S-1	po	80.100.120mg/DAY

投与スケジュール: 3週毎に投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
②	デキサート6.6mg+生食100mL	div 30min		●																				
④	ドセタキセル( )mg+生食 250ml ※DTXは2コース目より開始し7コース目まで投与	div 1hr		●																				
⑤	S-1( )mg	po		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
<p>・DTXは2コースより投与開始し7コース目まで継続                      ・S-1は1~7コース目までは14日間投与7日間休薬                      ⇒8コース目以降は28日間投与14日間休薬</p> <p>手術6週目までに治療開始し、手術1年後まで繰り返す</p>			<p>デキサメタゾン 4mg 2T 2x朝・夕食後は別途処方願います (1日目、2日目服用)</p>																					

開始予定日 あり 年 月 日 なし



# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	GEM 単剤
診療科	内科
適応	膵がん
登録年月日	2007.01.31

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ゲムシタビン	div	1000mg/m <sup>2</sup>

投与スケジュール: 週1回 3週連続投与 4週目休み

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセトロンバッグ(3mg) 1B	div 30min		●							●							●													
②	ゲムシタビン( )mg+生食 100ml	div 30min		●							●							●													

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	GEM+nab-PTX
診療科	消化器内科
適応	膵がん
登録年月日	2015.6.6

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
GEM	div	1000mg/m <sup>2</sup>
nab-PTX	div	125mg/m <sup>2</sup>

投与スケジュール: 3週投与1週休薬

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																														
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
①	アロキシ0.75mg+デカドロン6.6mg+50mL	div 30min		●																													
②	アブラキサン注(注1)mg+生食 <アブラキサン注 1Vあたり生食20mLで溶解>	div 30min		●																													
③	生食50mL	div 15min		●																													
④	ゲムシタビン( )mg+生食100mL	div 30min		●																													

開始予定日 あり 年 月 日 なし



# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	GEM+S-1療法
診療科	内科
適応	膵がん
登録年月日	2007.02.03

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ゲムシタビン	div	1000mg/m <sup>2</sup>
TS-1	po	80mg/m <sup>2</sup>

投与スケジュール: 2週毎投与(TS-1は初日より2週間投与)

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセトロンバッグ(3mg) 1B	div 30min		●														●													
②	ゲムシタビン( )mg+生食 100ml	div 30min		●														●													
③	TS-1( )mg	po		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	GC療法
診療科	腫瘍内科
適応	胆道がん
登録年月日	20160415

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ゲムシタビン	div	1000mg/m <sup>2</sup>
シスプラチン	div	25mg/m <sup>3</sup>

投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
メイン	ソリタT3号 500mL+生食500mL(メイン)	div 4hr		●							●																									
①	アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg+生食100mL	div 30min		●							●																									
②	硫酸Mg補正液20mL+生食50mL	div 30min		●							●																									
③	シスプラチン( )mg+生食250mL	div 1hr		●							●																									
④	フロセミド20mg 1A	iv		●							●																									
⑤	ゲムシタビン( )mg+生食100mL	div 30min		●							●																									
			デカドロン錠4mg/日 DAY2-4、9-11に服用 イメンドカプセルセット別途処方																																	

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	GS療法(胆道癌)
診療科	腫瘍内科
適応	胆道がん
登録年月日	2018.05.15

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ゲムシタビン	div	1000mg/m <sup>2</sup>
S-1	po	60mg/m <sup>2</sup>

投与スケジュール: 3週毎投与(TS-1は初日より2週間投与)

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセトロンバッグ(3mg) 1B	div 30min		●							●																				
②	ゲムシタビン( )mg+生食 100ml	div 30min		●							●																				
③	S-1( )mg	po		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 外来化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	キイトルーダ療法
診療科	腫瘍内科
適応	悪性黒色腫
登録年月日	2018.4.1

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
キイトルーダ	div	200mg/body

投与スケジュール: 1クール21日

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ポララミン5mg+生食50mL	div 15min		●																											
②	生食50mL (フラッシング)	div 15min		●																											
③	キイトルーダ200mg+生食100mL ※0.2~5μ mのインラインフィルターを使用	div 30min		●																											
④	生食50mL (フラッシング)	div 15min		●																											

開始予定日 あり 年 月 日 なし

# 外来化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	FP+C-mab
診療科	腫瘍内科
適応	頭頸部がん
登録年月日	2018.5.2

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
セツキシマブ(初回)	div	400mg/m <sup>2</sup>
セツキシマブ(2回目以降)	div	250mg/m <sup>2</sup>
シスプラチン	div	100mg/m <sup>2</sup>
5-FU	civ	1000mg/m <sup>2</sup>

## 投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	アロキシ0.75mg+デキサト注9.9mg+生食100mL	div 30min		●																											
	デキサト注6.6mg+生食50mL(側管から)	div 30min			●	●	●				●							●													
	生食1000mL+ソリタT3 500mL(側管から)	div 12hr			●	●																									
	生食1000mL+硫酸Mg20mL+KCL20mL	div 2hr		●																											
	ポララミン5mg+生食50mL	div 15min		●							●							●													
	セツキシマブ( )mg+生食250mL(2回目以降1時間)	div 2hr		●							●							●													
	生食50mL	div 30min		●																											
	20%マンニトール 300mL	div 45min		●																											
	シスプラチン( )mg+生食500mL(Total 500mL)	div 2hr		●																											
	5-FU( )mg+生食250mL	div 24hr		●	●	●	●																								
	生食500mL(側管から)	div 6hr		●																											
	生食50mL(フラッシュ用)	div 15min						●			●							●													

イメドカプセルセット別途処方  
(1日目から3日間内服)



