

外来化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	ドセタキセル少量ケモラジ
診療科	耳鼻科
診療科責任者	
申請者名	
適応	頭頸部がん
登録年月日	2010.06.28

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ドセタキセル	div	10mg/m ²

投与スケジュール: 1週間毎投与

1日目																																
投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
①	生食 50ml	div 15min		●																												
①	ドセタキセル ()mg + 生食 250ml	div 1hr		●																												
②	生食 100ml	div 1hr		●																												

開始予定日 あり 年 月 日 なし

外来化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	Weekly CBDCA+RT
診療科	耳鼻咽喉科
診療科責任者	
申請者名	
適応	頭頸部がん
登録年月日	2016.09.26

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
CBDCA	div	AUC(1.5)

投与スケジュール: 1週間毎投与

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ナゼア0.3mg+デキサート9.9mg+生食100mL	div 30min		●																											
①	カルボプラチン()mg+生食500mL	div 90min		●																											
	デカドロン錠0.5mg	1日8錠 1日2回			●	●																									

開始予定日 あり 年 月 日 なし

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	アービタックス併用放射線療法(初回)
診療科	耳鼻咽喉科
診療科責任者	
申請者名	
適応	頭頸部がん
登録年月日	2013.04.09

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
アービタックス(初回)	div(2hr)	400mg/m ²
アービタックス(2回目以降)	div(1hr)	250mg/m ²

投与スケジュール: 週1回投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	デキサート注(3.3mg)1A+生食100mL	div 30min		●																											
②	ポララミン注5mg+生食20mL	iv		●																											
③	アービタックス()mg+生食 500mL(250mL) ※Total 500mL(250mL)にする。①終了後30分後から開始	div 2hr(1hr)		●																											
④	生食 100ml フラッシュ用	div 1hr		●																											
	※ヒルドイドローション 1本 1日2回当日より塗布																														
	※ミノマイシンカプセル100mg 2CAP 1日2回 朝夕食後 14日分 当日より内服																														

開始予定日 あり 年 月 日 なし

外来化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	傍神経節腫瘍に対するCVD療法
診療科	耳鼻科
診療科責任者	
申請者名	
適応	悪性傍神経節腫瘍
登録年月日	2010.11.25

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
エンドキサン	div	750mg/m ²
オンコビン	div	1.4mg/m ²
ダカルバジン	div	200mg/m ²

投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																													
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
①	アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg+生食100ml	div 30min		●																												
②	ダカルバジン()mg+生食100ml	div 30min		●	●	●	●	●																								
③	エンドキサン()mg+生食500ml	div 2hr		●																												
④	生食20ml (フラッシュ用:エンドキサンの後)	div フラッシュ		●																												
⑤	オンコビン()mg+生食50ml	div 15min		●																												
⑥	ソルアセトF 1,000ml	div 4hr		●																												
⑦	デキサート6.6mg+生食100ml (ダカルバジンの前)	div 30min			●	●	●	●																								
⑧	生食20ml (フラッシュ用:ダカルバジンの後)	div フラッシュ			●	●	●	●																								
⑨	デキサート3.3mg+メクロプラミド*1A+生食100ml (嘔気時2回まで)	div 30min		●	●	●	●	●																								

開始予定日 あり 年 月 日 なし

外来化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	TPF療法
診療科	耳鼻咽喉科
診療科責任者	
申請者名	
適応	頭頸部がん
登録年月日	2010.06.28(2017.07.15改定)

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ドセタキセル	div	75mg/m ²
シスプラチン	div	75mg/m ²
5-FU	div	750mg/m ²

投与スケジュール: 4週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	フィジオ140 1000mL+ソリタT3 500mL	div 15hr	●																												
②	アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg+硫酸Mg 20mL+生食100mL	div 30min		●																											
③	ドセタキセル()mg+5%ブドウ糖 250mL	div 75min		●																											
④	シスプラチン()mg+生食 250mL	div 2hr		●																											
⑤	生食20mL	iv		●																											
⑥	マンニトール 300mL	div 1hr		●																											
⑦	生食20mL	iv		●																											
⑧	5-FU()mg+ソリアセトF 1000mL+ソリタT3 500mL	div 20hr		●																											
⑨	フィジオ140 1000mL (⑧の5-FUと同時に開始、側管から)	div 4hr		●																											
⑩	5-FU()mg+ソリアセトF 1000mL+ソリタT3 500mL	div 24hr			●	●	●	●																							
⑪	メクロプラミド10mg+デキサート6.6mg+生食100mL (⑩と同時に開始。側管から)	div 30min			●	●	●	●																							
⑫	フィジオ140 1000mL (⑪終了後開始、側管から)	div 4hr			●	●	●	●																							
⑬	フィジオ140 1000mL+ソリタT3 500mL	div 8hr							●	●																					

イメドカプセルセット(DAY1-3)
イメドカプセル80mg(DAY4-5)は別途処方にて対応

外来化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	DTX療法(耳鼻科)
診療科	耳鼻咽喉科
診療科責任者	
申請者名	
適応	咽頭がん
登録年月日	2013.07.08

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ドセタキセル	div	60mg/m ²

投与スケジュール: 3週毎投与

1日目																															
投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセトロンバッグ(3mg)+デキサート6.6mg 1A	div 30min		●																											
②	ドセタキセル()mg+生食 250ml	div 1hr		●																											

開始予定日 あり 年 月 日 なし

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	CBDCA+PTX療法
診療科	耳鼻咽喉科
診療科責任者	
申請者名	
適応	頭頸部がん
登録年月日	2016.11.24

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
カルボプラチン(AUC=6)	div	6 × (Ccr+25)
パクリタキセル	div	200mg/m ²

投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	アロキシ0.75mg+デキサート16.5mg+ポララミン5mg ファミチン注20mg+生理食塩液100mL	div 30min		●																											
②	パクリタキセル()mg+生食 250ml	div 3hr		●																											
③	カルボプラチン()mg+生食 250ml	div 1hr		●																											
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> ・デカドロン錠4mg/日 DAY2-3に服用 ・イメンドカプセルセット別途処方 </div>																														

開始予定日 あり 年 月 日 なし

外来化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	オブジーボ療法
診療科	耳鼻咽喉科
診療科責任者	
申請者名	
適応	頭頸部がん
登録年月日	2017.10.2

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オブジーボ	div	240mg

投与スケジュール: 1クール14日

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																													
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
①	ポララミン5mg+生食50mL	div 15min		●																												
②	生食50mL (フラッシング)	div 15min		●																												
③	オブジーボ点滴静注240mg+生食100mL ※0.2又は0.22μ mのインラインフィルターを使用	div 30min		●																												
④	生食50mL (フラッシング)	div 15min		●																												

開始予定日 あり 年 月 日 なし

外来化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	FP+C-mab
診療科	腫瘍内科
診療科責任者	
申請者名	
適応	頭頸部がん
登録年月日	2018.5.2

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
セツキシマブ(初回)	div	400mg/m ²
セツキシマブ(2回目以降)	div	250mg/m ²
シスプラチン	div	100mg/m ²
5-FU	civ	1000mg/m ²

投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	アロキシ0.75mg+デキサト注9.9mg+生食100mL	div 30min		●																											
	デキサト注6.6mg+生食50mL(側管から)	div 30min			●	●	●				●							●													
	生食1000mL+ソリタT3 500mL(側管から)	div 12hr			●	●																									
	生食1000mL+硫酸Mg20mL+KCL20mL	div 2hr		●																											
	ポララミン5mg+生食50mL	div 15min		●							●							●													
	セツキシマブ()mg+生食250mL(2回目以降1時間)	div 2hr		●							●							●													
	生食50mL	div 30min		●																											
	20%マンニトール 300mL	div 45min		●																											
	シスプラチン()mg+生食500mL(Total 500mL)	div 2hr		●																											
	5-FU()mg+生食250mL	div 24hr		●	●	●	●																								
	生食500mL(側管から)	div 6hr		●																											
	生食50mL(フラッシュ用)	div 15min						●			●							●													

イメドカプセルセット別途処方
(1日目から3日間内服)
シスプラチンによる吐き気予防

