

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	GC療法
診療科	泌尿器科
診療科責任者	
申請者名	
適応	尿路上皮がん
登録年月日	2010.02.09(20190404改定)

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ゲムシタビン	div	1000mg/m ²
シスプラチン	div	70mg/m ²

投与スケジュール: 1クール28日間

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	パロセトロン0.75mg+デカドロン注6.6mg+生食100mL	div 30min		●																											
①	グラニセトロンバック3mg+デカドロン注6.6mg	div 30min									●							●													
②	ゲムシタビン()mg+生食100mL	div 30min		●							●							●													
③	生食1000mL+硫酸Mg補正液20mL+KCL20mL	div 3hr			●																										
④	デカドロン注9.9mg+生食500mL	div 2hr			●																										
⑤	マンニトール 150mL	div 45min			●																										
⑥	シスプラチン()mg+生食250mL	div 3hr			●																										
⑦	マンニトール 150ml	div 45min			●																										
⑧	生食1000mL+ソリタT3号 500ml	div 10hr			●	●	●																								

アプレピタントカプセルセットDAY2-4
デキサメタゾン8mg DAY3-5

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	GCb療法
診療科	泌尿器科
診療科責任者	
申請者名	
適応	尿路上皮がん
登録年月日	2013.07.11

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ゲムシタビン	div	1000mg/m ²
カルボプラチン	div	AUC5

投与スケジュール: 1クール28日間

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	パロ/セトロン0.75mg+デカドロン注6.6mg+生食100ml	div 30min		●																											
①	ナゼア0.3mg+デカドロン6.6mg+100ml	div 30min									●							●													
②	ゲムシタビン()mg+生食100ml	div 30min		●							●							●													
③	ソリタT3 500ml+ヴィーンF 500ml	div 6hr			●																										
④	デカドロン注6.6mg+生食500ml	div 2hr			●																										
⑤	マンニトール 150ml	div 1hr			●																										
⑥	カルボプラチン()mg+生食500ml	div 3hr			●																										
⑦	マンニトール 150ml	div 2hr			●																										
⑧	ヴィーンF 500ml+ソリタT3 1000ml	div 10hr			●																										

※アプレピタントカプセルセット
DAY1 125mg、DAY2,3 80mg服用する

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	ニボルマブ+カボザンチニブ療法
診療科	泌尿器科
適応	根治切除不能な転移性の腎細胞癌
登録年月日	2021.9.8

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ニボルマブ	div	240mg
カボザンチニブ	po	40mg

投与スケジュール: 1クール14日

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ポララミン5mg+生食50mL	div 15min		●																											
②	生食50mL (フラッシング)	div 15min		●																											
③	オブジーボ点滴静注240mg+生食100mL ※0.2又は0.22µ mのインラインフィルターを使用	div 30min		●																											
④	生食50mL (フラッシング)	div 15min		●																											
	カボザンチニブ 40mg/日	po 空腹時		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
			※カボザンチニブは別途処方願います																												