

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	SOX+BEV療法(大腸癌)
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	20160415

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オキサリプラチン	div	130mg/m ²
S-1	po	40~60mg/回×2
ベバシズマブ	div	7.5mg/kg

S-1投与量

体表面積	<1.25	1.25~1.5	1.5≤
投与量(1回量)	40mg	50mg	60mg

投与スケジュール: 3週毎投与(TS-1は初日より2週間投与)

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセトンバッグ3mg 100mL+デキサート4.95mg	div 30min		●																											
②	ベバシズマブ()mg + 生食 100ml	div 30~90min		●																											
③	生食100mL	div		●																											
②	オキサリプラチン()mg+ 5% ブドウ糖 250mL	div 2hr		●																											
③	S-1()mg	po		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														

・アプレピタントカプセルセット(DAY1-3)内服
 ・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用

※1クール21日となります(枠内)

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	BEV+m-FOLFOX
診療科	腫瘍内科
適応	大腸癌
登録年月日	2007.10.04

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オキサリプラチン	div	85mg/m ²
レボホリナート	div	200mg/m ²
フルオウラシル (bolus)	div(全開)	400mg/m ²
フルオウラシル	civ	2400mg/m ²
ペバシズマブ	div	5mg/kg

投与スケジュール: 2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	プロイメンド150mg+デキサート4.95mg+生食100mL	div 30min		●																											
②	グラニセトロンバッグ3mg 100mL	div 30min		●																											
③	ペバシズマブ()mg + 生食 100ml	div 90-30min		●																											
④	生食 50ml フラッシュ用	div		●																											
⑤	オキサリプラチン()mg+5%ブドウ糖 250ml	div 2hr		●																											
⑥	レボホリナート()mg+5%ブドウ糖 250ml ⑤と同時に	div 2hr		●																											
⑦	5-FU()mg+生食 50ml ⑤⑥終了後 bolus	div 全開		●																											
⑧	5-FU()mg+生食 入院230mL/外来130mL	civ 46hr		●																											
				・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用																											

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	BEV+FOLFIRI療法
診療科	腫瘍内科
適応	大腸癌
登録年月日	2007.10.04

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
イリノテカン	div	150mg/m ²
レボホリナート	div	200mg/m ²
フルオロウラシル (bolus)	div (全開)	400mg/m ²
フルオロウラシル	civ	2400mg/m ²
ベバシズマブ	div	5mg/kg

投与スケジュール: 2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	プロイメンド150mg+デキサート4.95mg+生食100mL	div 30min		●																											
②	グラニセトロンバッグ3mg 100mL	div 30min		●																											
③	ベバシズマブ()mg + 生食 100ml	div 90-30min		●																											
④	生食 50ml フラッシュ用	div		●																											
⑤	イリノテカン()mg+5%ブドウ糖 250ml	div 2hr		●																											
⑥	レボホリナート()mg+5%ブドウ糖 250ml ⑤と同時に	div 2hr		●																											
⑦	5-FU()mg+生食 50ml ⑤⑥終了後 bolus	div 全開		●																											
⑧	5-FU()mg+生食 入院230mL/外来130mL	civ 46hr		●																											
				・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用																											

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	アービタックス+FOLFOX
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	20160414

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
アービタックス(初回)	div(2hr)	400mg/m ²
アービタックス(2回目以降)	div(1hr)	250mg/m ²
オキサリプラチン	div	85mg/m ²
レボホリナート	div	200mg/m ²
5-FU(bolus)	div(全開)	400mg/m ²
5-FU	civ	2400mg/m ²

投与スケジュール: 2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
①	プロイメンド150mg+デキサート4.95mg+生食100mL	div 30min		●																												
①	デキサート注6.6mg+生食100mL	div 30min									●																					
②	グラニセトンバッグ3mg 100mL	div 30min		●																												
③	ホラミン5mg+生食50mL	div 15min		●							●																					
④	アービタックス()mg+生食()ml ※Total 250mlにする。	div 1or2hr		●							●																					
⑤	生食 100ml フラッシュ用	div 1hr		●							●																					
⑥	オキサリプラチン()mg+5%ブドウ糖 250ml	div 2hr		●																												
⑦	レボホリナート()mg+5%ブドウ糖 250ml ⑥と同時に	div 2hr		●																												
⑧	5-FU()mg+生食 50ml ⑥⑦終了後 bolus	div 全開		●																												
⑨	5-FU()mg+生食 入院230mL/外来130mL	civ 46hr		●																												

デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	ベクティビックス+FOLFIRI
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2016.06.13

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ベクティビックス	div	6mg/kg
イリノテカン	div	150mg/m ²
レボホリナート	div	200mg/m ²
5-FU(bolus)	div(全開)	400mg/m ²
5-FU	civ	2400mg/m ²

投与スケジュール: 2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	プロイメンド150mg+デキサート4.95mg+生食100mL	div 30min		●																											
②	グラニセトロンバッグ3mg 100mL	div 30min		●																											
③	ベクティビックス()mg+生食 100ml ※Total 100mlにする。	div 1hr		●																											
④	生食 100ml フラッシュ用	div 1hr		●																											
⑤	イリノテカン()mg+5%ブドウ糖 250ml	div 2hr		●																											
⑥	レボホリナート()mg+5%ブドウ糖 250ml ⑤と同時に	div 2hr		●																											
⑦	5-FU()mg+生食 50ml ⑤⑥終了後 bolus	div 全開		●																											
⑧	5-FU()mg+生食 入院230mL/外来130mL	civ 46hr		●																											

デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	ベクティックス+m-FOLFOX 6
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2016.06.13

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ベクティックス	div	6mg/kg
オキサリプラチン	div	85mg/m ²
レボホリナート	div	200mg/m ²
5-FU(bolus)	div(全開)	400mg/m ²
5-FU	civ	2400mg/m ²

投与スケジュール: 2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール: 2週毎投与																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	プロイメンド150mg+デキサート4.95mg+生食100mL	div 30min		●																											
②	グラニセトロンバッグ3mg 100mL	div 30min		●																											
③	ベクティックス()mg+生食 100mL ※Total 100mLにする。	div 1hr		●																											
④	生食 100mL フラッシュ用	div		●																											
⑤	オキサリプラチン()mg+5%ブドウ糖 250mL	div 2hr		●																											
⑥	レボホリナート()mg+5%ブドウ糖 250mL ⑤と同時に	div 2hr		●																											
⑦	5-FU()mg+生食 50mL ⑤⑥終了後 bolus	div 全開		●																											
⑧	5-FU()mg+生食 入院230mL/外来130mL	civ 46hr		●																											

・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	ベクティビックス+CPT-11
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2016.06.13(2017.07.28改定)

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ベクティビックス	div	6mg/kg
イリノテカン	div	150mg/m ²

投与スケジュール：2週毎

投与順	+	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセロンハッグ3mg+テキサート4.95mg	div 30min		●														●													
②	ベクティビックス()mg+生食 100ml ※Total 100mlにする。	div 1hr		●														●													
③	生食 100ml フラッシュ用	div 1hr		●														●													
④	イリノテカン()mg+生食 500ml	div 2hr		●														●													
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> ・アプレピタントカプセル125mg DAY1 80mg DAY2-3 に服用 ・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用 </div>																												

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	XELOX療法
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2016.06.13

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オキサリプラチン	div	130mg/m ²
ゼロータ錠	po	1000mg/m ² /回

投与スケジュール: 3週間毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセロンバック3mg+デキサート4.95mg	div 30min		●																											
②	オキサリプラチン()mg+5%ブドウ糖 500ml	div 120min		●																											
③	カペシタビン錠300 ()mg	po 分2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														

・アプレピタントカプセルセット(DAY1-3)内服
 ・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	XELOX+BEV
診療科	腫瘍内科
適応	大腸癌
登録年月日	2016.06.13

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ベバシズマブ	div	7.5mg/kg
オキサリプラチン	div	130mg/m ²
カペシタビン	po	注1

注1): ①1.36m²未満: 1200mg②1.36m²~1.66m²: 1500mg③1.66m²~1.96m²: 1800mg④1.96m²以上: 2100mg

投与スケジュール: 3週間毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセロンバック3mg+デキサート4.95mg	div 30min		●																											
②	ベバシズマブ()mg + 生食 100ml	div 30~90min		●																											
③	生食50mL フラッシュ用	div		●																											
④	オキサリプラチン()mg+5%ブドウ糖 500ml	div 2hr		●																											
⑤	カペシタビン()mg	po 分2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														

・アプレタントカプセルセット(DAY1-3)内服
・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	SIRB療法
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2016.09.14(2017.7.28改定)

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
イリノテカン	div	150mg/m ²
ベバシズマブ	div	7.5mg/kg
S-1	po	

投与スケジュール: 3週間毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセロンハッグ3mg+デキサート4.95mg	div 30min		●																											
②	ベバシズマブ(7.5mg/kg)+生食100mL	div 30min		●																											
③	生食100mL	div 30min		●																											
④	イリノテカン(150mg/m ²) + 5%ブドウ糖500mL	div 90min		●																											
	S-1 ()mg	po 分2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
			<p>・アプレピタントカプセル125mg DAY1 80mg DAY2-3 に服用</p> <p>・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用</p>																												

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	IRIS+BEV療法
診療科	腫瘍内科
適応	転移性大腸がん
登録年月日	2011.03.04(2017.7.28改定)

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
イリノテカン	div	100mg/m ²
ベバシズマブ	div	5mg/kg
TS-1	po	80~120mg/2×

※TS-1投与量表

体表面積	<1.25	1.25~1.5	1.5≤
投与量(1回量)	40mg	50mg	60mg

投与スケジュール: 2週毎投与(TS-1は初日より2週間投与)

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセロンバッグ3mg+デキサート4.95mg	div 30min		●														●													
②	ベバシズマブ()mg + 生食 100ml	div 30~90min		●														●													
③	生食 50ml フラッシュ用	div		●														●													
④	イリノテカン()mg+ 5% ブドウ糖 500ml	div 1.5hr		●														●													
⑤	TS-1()mg	po		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
																			※1クール28日となります(枠内)												
																			・アプレピタントカプセル125mg DAY1.15 80mg DAY2-3 16-17に服用 ・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4.16-18に服用												

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	FOLFIRI+サイラムザ療法
診療科	消化器内科
適応	進行大腸癌
登録年月日	2016.09.15

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ラムシルマブ	div	8mg/kg
イリノテカン	div	150mg/m ²
レボホリナート	div	200mg/m ²
5-FU(bolus)	div(全開)	400mg/m ²
5-FU	civ	2400mg/m ²

投与スケジュール: 2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ポララミン5mg+生食50mL	div 15min		●																											
②	サイラムザ(8mg/kg)+生食250mL	div 1hr (2回目以降30min)		●																											
③	プロイメンド150mg+デキサート注4.95mg+生食100mL	div 30min		●																											
④	グラニセトロンバッグ3mg	div 30min		●																											
⑤	イリノテカン(150mg/m ²)mg+5%ブドウ糖 250ml	div 2hr		●																											
⑤	レボホリナート(200mg/m ²)mg+5%ブドウ糖 250ml	div 2hr		●																											
⑥	5-FU()mg+生食 50ml	div 全開		●																											
⑦	5-FU()mg+生食 入院230mL/外来130mL	civ 46hr		●																											
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用 </div>																												

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	FOLFOXIRI+BEV
診療科	腫瘍内科
適応	大腸癌
登録年月日	2016.12.1

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ベバシズマブ	div	5mg/kg
オキサリプラチン	div	85mg/m ²
イリノテカン	div	150mg/m ²
レボホリナート	div	200mg/m ²
5-FU	civ	2400mg/m ²

投与スケジュール: 2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
①	プロイメンド150mg+デキサート9.9mg+生食100mL	div 30min		●																												
②	パロセトン0.75mg+生食100mL	div 30min		●																												
③	ベバシズマブ()mg+生食100mL	div 90~30min		●																												
④	イリノテカン()mg+5%ブドウ糖 250ml	div 90min		●																												
⑤	オキサリプラチン()mg+5%ブドウ糖 250ml	div 2hr		●																												
⑥	レボホリナート()mg+5%ブドウ糖 250ml ④終了後⑤と同時に	div 2hr		●																												
⑦	5-FU()mg+生食 入院230mL/外来130mL	civ 46hr		●																												
			デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用																													

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	UFT/LV+BEV
診療科	消化器内科
適応	大腸がん
登録年月日	R1.7.22

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
UFT	po	300mg/m ² /DAY 分3
LV	po	75mg/DAY 分3
ベバシズマブ	div	5mg/kg

投与スケジュール: 4週毎

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ベバシズマブ()mg + 生食 100ml	div 30~90min		●														●													
②	生食 50ml	div フラッシュ用		●														●													
③	UFT/LV	po		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

※1クール28日となります(枠内)

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	CPT-11+CDDP療法
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	2016.07.26

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
イリノテカン	div	70mg/m ²
シスプラチン	div	80mg/m ²

投与スケジュール: 4週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ハロノセトン0.75mg+デキサート9.9mg+生食100mL	div 30min		●																											
①	ハロノセトン0.75mg+デキサート4.95mg+生食100mL	div 30min																●													
②	イリノテカン()mg+5%ブドウ糖250mL	div 90min		●														●													
③	生食1000mL+硫酸Mg20mL+KCL20mL	div 2hr		●																											
④	20%マンニトール 300mL	div 45min		●																											
⑤	シスプラチン 80mg/m ² +生食 500ml	div 2hr		●																											
⑥	生食500mL	div 6hr		●																											
⑦	デキサート注(6.6mg)+生食50ml	div 30min			●	●	●																								
⑨	生食1000mL+ソリタT3 500mL	div 12hr			●	●																									
⑩	生食50mL(側管から)	div 30min					●											●													

アプレピタントカプセルセット別途処方(DAY1と15)
DEX4mg (DAY16-18分)別途処方

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	SP+HER療法
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	20160414

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
S-1	po	80mg/m ² (分2)
シスプラチン	div	60mg/m ²
トラスツズマブ	div	6mg/kg (初回8mg/kg)

投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	~	35
①	パロセトン0.75mg+デキサート注9.9mg+生食100mL	div 30min		●																										
②	生食1000mL+硫酸Mg補正液20mL+KCL20mL	div 2hr		●																										
③	トラスツズマブ()mg+生食 250mL	div 90min以上		●																										
④	20%マンニトール300mL	div 45min		●																										
⑤	シスプラチン 60mg/m ² +生食 500ml	div 2hr		●																										
⑥	生食500mL	div 6hr		●																										
⑦	デキサート注(6.6mg)+生食50ml	div 30min			●	●	●																							
⑧	生食1000mL+ソリタT3号 500ml	div 12hr			●	●																								
	S-1 80mg/m ²	po 分2(朝・夕)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													

・アプレピタントカプセル125mg DAY1
80mg DAY2-3 に服用

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	XP+HER療法(アプレピタント)
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	20160414

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ゼローダ	po	1000mg/m ²
シスプラチン	div	80mg/m ²
トラスツズマブ	div	6mg/kg (初回8mg/kg)

投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	~	35
①	パロノセトン0.75mg+デキサート注9.9mg+生食100mL	div 30min		●																										
②	生食1000mL+硫酸Mg補正液20mL+KCL20mL	div 2hr		●																										
③	トラスツズマブ()mg+生食 250mL	div 90min以上		●																										
④	20%マンニトール300mL	div 45min		●																										
⑤	シスプラチン 60mg/m ² +生食 500ml	div 2hr		●																										
⑥	生食500mL	div 6hr		●																										
⑦	デキサート注(6.6mg)+生食50ml	div 30min			●	●	●																							
⑧	生食1000mL+ソリタT3号 500ml	div 12hr			●	●																								
	カペシタビン	po 分2(朝・夕)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													

・アプレピタントカプセル125mg DAY1
80mg DAY2-3 に服用
・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用

外来化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	FP+HER療法(胃)(カプセル)
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	20160421

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
5-FU	civ	800mg/m ²
シスプラチン	div	80mg/m ²
トラスツズマブ(初回)	div	8mg/kg
トラスツズマブ(2回目以降)	div	6mg/kg

投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール: 3週毎投与																													
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
①	ハロノセトロン0.75mg+デキサート9.9mg+生食100mL	div 30min		●																												
②	生食1000mL+硫酸Mg20mL+KCL20mL	div 2hr		●																												
③	トラスツズマブ()mg+生食250mL(2回目以降30分)	div 1.5hr		●																												
④	生食50mL(側管から)	div 15min		●																												
⑤	5-FU()mg+生食250mL	div 24hr		●	●	●	●	●																								
⑥	20%マンニトール 300mL	div 45min		●																												
⑦	シスプラチン()mg+生食500mL(Total 500mL)	div 2hr		●																												
⑧	生食500mL	div 6hr		●																												
⑨	デキサート注6.6mg+生食50mL	div 30min			●	●	●	●																								
⑩	生食1000mL+ソリタT3 500mL	div 12hr			●	●																										
⑪	生食50mL(側管から)	div 30min																														

アプレピタントカプセルセット別途

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	SP療法
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	2016.06.13

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
S-1	po	80mg/m ² (分2)
シスプラチン	div	60mg/m ²

投与スケジュール: 5週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	~	35
①	パロセトロン0.75mg+デキサート9.9mg+生食250mL	div 1hr									●																			
②	生食1000mL+硫酸Mg補正液20mL+KCL20mL	div 2hr									●																			
③	20%マンニトール300mL	div 45min									●																			
④	シスプラチン 60mg/m ² +生食 500ml	div 2hr									●																			
⑤	生食500mL	div 6hr									●																			
⑥	デキサート注(6.6mg)+生食50ml	div 30min										●	●	●																
⑦	生食1000mL+ソリタT3号 500ml	div 12hr										●	●																	
	S-1 80mg/m ²	po 分2(朝・夕)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

アプレピタントカプセルセット別途処方

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	SOX療法(胃癌)
診療科	消化器内科
適応	胃がん
登録年月日	20150620

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オキサリプラチン	div	100mg/m ²
S-1	po	40~60mg/回×2

※S-1投与量表

体表面積	<1.25	1.25~1.5	1.5≦
投与量(1回量)	40mg	50mg	60mg

投与スケジュール: 3週毎投与(TS-1は初日より2週間投与)

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセトロンバッグ3mg 100mL+デキサート4.95mg	div 30min		●																											
②	オキサリプラチン()mg+ 5% ブドウ糖500mL	div 2hr		●																											
	S-1()mg	po		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> ・アプレピタントカプセルセット(DAY1-3)内服 ・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用 </div>																												

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	DCF療法(イメト)
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	2016.10.11

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ドセタキセル	div	75mg/m ²
シスプラチン	div	75mg/m ²
5-FU	div	750mg/m ²

投与スケジュール:4週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	パロノセロン0.75mg+デキサト注9.9mg+生食100mL	div 30min		●																											
①	デキサト注6.6mg+生食100mL(側管から)	div 30min			●	●	●	●																							
②	生食1000mL+ソリタT3 500mL(側管から)	div 12hr			●	●																									
②	生食1000mL+硫酸Mg20mL+KCL20mL	div 2hr		●																											
③	ドセタキセル注+生食250mL	div 1hr		●																											
④	マンニトール300mL	div 45min		●																											
⑤	シスプラチン()mg+生食500mL(Total 500mL)	div 2hr		●																											
⑥	5-FU()mg+生食250mL	div 24hr		●	●	●	●	●																							
⑦	生食500mL(側管から)	div 6hr		●																											
⑧	生食50mL(側管から)	div 6hr							●																						

アプレピタントカプセルセット別途処方

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	FP療法(胃)(アプレピタントver)
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	2016.06.13

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
5-FU	div	800mg/m ²
シスプラチン	div	80mg/m ²

投与スケジュール: 4週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	パロノセトン0.75mg+デキサート9.9mg+生食100mL	div 30min		●																											
①	生食1000mL+ソリタT3 500mL	div 12hr			●	●																									
②	デキサート注(6.6mg)+生食50ml	div 30min			●	●	●	●																							
②	生食1000mL+硫酸Mg20mL+KCL20mL	div 2hr		●																											
③	5-FU()mg+生食250mL	div 24hr		●	●	●	●	●																							
④	20%マンニトール 300mL	div 45min		●																											
⑤	シスプラチン 80mg/m ² +生食 500ml	div 2hr		●																											
⑦	生食500mL(側管から)	div 6hr		●																											
⑧	生食50mL	div 30min							●																						

アプレピタントカプセルセットは別途

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	CPT-11(2週毎)
診療科	内科
適応	胃がん
登録年月日	2010.11.25

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
イリノテカン	div	150mg/m2

投与スケジュール: 2週毎

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセトロン3mgバッグ+デキサート4.95mg	div 30min		●														●													
②	イリノテカン()mg+5%ブドウ糖 250mL	div 1.5hr		●														●													

・アプレピタントカプセル125mg DAY1
80mg DAY2-3 に服用
・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	XP(Cape+CDDP)療法
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	20160414

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
カペシタビン	経口	1000mg/m ²
シスプラチン	div	80mg/m ²

投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ハロ/セトロン0.75mg+デキサト注9.9mg+生食100mL	div 30min		●																											
②	生食1000mL+硫酸Mg補正液20mL+KCL20mL	div 2hr		●																											
③	20%マンニトール300mL	div 45min		●																											
④	シスプラチン 60mg/m ² +生食 500ml	div 2hr		●																											
⑤	生食500mL	div 6hr		●																											
⑥	デキサト注(6.6mg)+生食50ml	div 30min			●	●	●																								
⑦	生食1000mL+ソリタT3号 500ml	div 12hr			●	●																									
⑧	カペシタビン	po 分2(朝・夕)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														

・アプレピタントカプセル125mg DAY1
80mg DAY2-3 に服用
・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	S-1+DTX(術後補助)
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん術後補助化学療法
登録年月日	2020.3.12

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
DTX	div	40mg/m ²
S-1	po	80.100.120mg/DAY

投与スケジュール: 3週毎に投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
②	デキサート6.6mg+生食100mL	div 30min		●																				
④	ドセタキセル()mg+生食 250ml ※DTXは2コース目より開始し7コース目まで投与	div 1hr		●																				
⑤	S-1()mg	po		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
<p>・DTXは2コースより投与開始し7コース目まで継続 ・S-1は1~7コース目までは14日間投与7日間休薬 ⇒8コース目以降は28日間投与14日間休薬</p> <p>手術6週目までに治療開始し、手術1年後まで繰り返す</p>			<p>デキサメタゾン 4mg 2T 2x朝・夕食後は別途処方願います (1日目、2日目服用)</p>																					

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	FOLFIRINOX療法
診療科	腫瘍内科
適応	膵がん
登録年月日	2014.06.24(※2016.12.1改変)

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オキサリプラチン	div	85mg/m ²
イリノテカン	div	150mg/m ²
レボホリナート	div	200mg/m ²
5-FU	civ	2400mg/m ²

※CPT-11 180mg/m²→150mg/m²、bolus 5-FU抜き

投与スケジュール: 2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	プロイメンド150mg+デキサート9.9mg+生食100mL	div 30min		●																											
②	パロ/セトン0.75mg+生食100mL	div 30min		●																											
③	オキサリプラチン()mg+5%ブドウ糖 250ml	div 2hr		●																											
④	レボホリナート()mg+5%ブドウ糖 250ml ③終了後と同時に	div 2hr		●																											
⑤	イリノテカン()mg+5%ブドウ糖 250ml ④投与30分後から開始(④と⑤は同時終了となる)	div 90min		●																											
⑥	5-FU()mg+生食 入院230mL/外来130mL	civ 46hr		●																											
			デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用																												

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	GC療法
診療科	腫瘍内科
適応	胆道がん
登録年月日	20160415

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ゲムシタビン	div	1000mg/m ²
シスプラチン	div	25mg/m ³

投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
メイン	ソリタT3号 500mL+生食500mL(メイン)	div 4hr		●							●																				
①	パロセトロン0.75mg+デキサート9.9mg+生食100mL	div 30min		●							●																				
②	硫酸Mg補正液20mL+生食50mL	div 30min		●							●																				
③	シスプラチン()mg+生食250mL	div 1hr		●							●																				
④	フロセミド20mg 1A	iv		●							●																				
⑤	ゲムシタビン()mg+生食100mL	div 30min		●							●																				
			デカドロン錠4mg/日 DAY2-4、9-11に服用 アプレピタントカプセルセット別途処方																												

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	FP+C-mab
診療科	腫瘍内科
適応	頭頸部がん
登録年月日	2018.5.2

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
セツキシマブ(初回)	div	400mg/m ²
セツキシマブ(2回目以降)	div	250mg/m ²
シスプラチン	div	100mg/m ²
5-FU	civ	1000mg/m ²

投与スケジュール:3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ハロ/セトロン0.75mg+デキサト注9.9mg+生食100mL	div 30min		●																											
	デキサト注6.6mg+生食50mL(側管から)	div 30min			●	●	●				●							●													
	生食1000mL+ソリタT3 500mL(側管から)	div 12hr			●	●																									
	生食1000mL+硫酸Mg20mL+KCL20mL	div 2hr		●																											
	ポララミン5mg+生食50mL	div 15min		●							●							●													
	セツキシマブ()mg+生食250mL(2回目以降1時間)	div 2hr		●							●							●													
	生食50mL	div 30min		●																											
	20%マンニトール 300mL	div 45min		●																											
	シスプラチン()mg+生食500mL(Total 500mL)	div 2hr		●																											
	5-FU()mg+生食250mL	div 24hr		●	●	●	●																								
	生食500mL(側管から)	div 6hr		●																											
	生食50mL(フラッシュ用)	div 15min						●			●							●													

アプレピタントカプセルセット別途処方
(1日目から3日間内服)

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	nal-IRI+5-FU/LV
診療科	腫瘍内科
適応	がん化学療法後に増悪した 治療切除不能な肺癌
登録年月日	

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
nal-IRI	div	70mg/m ²
レボホリナート	div	200mg/m ²
5-FU	civ	2400mg/m ²

投与スケジュール: 2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール: 2週毎投与																														
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
①	プロイメント [®] 150mg+デキサート4.95mg+生食100mL	div 30min		●																													
②	グラニセトロンバッグ3mg 100mL	div 30min		●																													
③	オニバイド()mg+5%ブドウ糖 500mL ※インラインフィルター使用しない	div 90min		●																													
④	生食 50mL(フラッシュ用)	div 全開		●																													
⑤	レボホリナート()mg+5%ブドウ糖 250mL	div 2h		●																													
⑥	フルオウラシル()+生食(※)mL	civ 46h		●																													
	※入院: Total 230mL ※外来: Total 130mL(トレフューザー)																																

・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用

化学療法レジメンスケジュール表

登録プロトコール名	5-FU+CBDCA+Pembro
診療科	腫瘍内科
適応	頭頸部がん
登録年月日	2021.2.15

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ペムブロリズマブ	div	200mg/body
カルボプラチン(AUC=5)	div	5 × (Ccr+25)
		Ccr単位: ml/min
フルオロウラシル	div	1000mg/m ²

投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール (Day 1 to Day 28)																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ポララミン注5mg+生食50mL	div 15min		●																											
②	生食 50ml(フラッシュ用)	div		●																											
③	キイトルーダ(200mg)+生食 100ml ※0.2~5μ mのインラインフィルターを使用	div 30min		●																											
④	生食 50ml(フラッシュ用)	div		●																											
⑤	パノセトロン0.75mg+デキサート注9.9mg+生食100mL	div 30min		●																											
⑥	デキサート注6.6mg+生食50mL	div 30min			●	●	●																								
⑦	カルボプラチン()mg+生食250mL	div 2hr		●																											
⑧	フルオロウラシル()mg+生食250mL	div 24hr		●	●	●	●																								
⑨	生食 50ml(フラッシュ用)	div						●																							

アプレピタントカプセルセットは別途処方
 ※125mg Day 1に内服
 80mg Day2-3に内服

