

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	SOX療法(130mg/m2)
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	20160415

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オキサリプラチン	div	130mg/m ²
S-1	po	※1

※S-1投与量表

体表面積	<1.25	1.25~1.5	1.5≤
投与量(1回量)	40mg	50mg	60mg

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	SOX+BEV療法(大腸癌)
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	20160415

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オキサリプラチン	div	130mg/m ²
S-1	po	40～60mg/回 × 2
ベバシズマブ	div	7.5mg/kg

S-1投与量

体表面積	<1.25	1.25~1.5	1.5≤
投与量(1回量)	40mg	50mg	60mg

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	XELOX療法
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2016.06.13

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オキサリプラチン	div	130mg/m ²
カペシタビン	po	注1

注1): ①1.36m²未満: 1200mg ②1.36m²~1.66m²: 1500mg ③1.66m²~1.96m²: 1800mg ④1.96m²以上: 2100mg

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	XELOX+BEV
診療科	腫瘍内科
適応	大腸癌
登録年月日	2016.06.13

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ヘパシス ^{マブ}	div	7.5mg/kg
オキサリプラチン	div	130mg/m ²
カペシタビン	po	注1

注1):①1.36m²未満:1200mg②1.36m²~1.66m²:1500mg③1.66m²~1.96m²:1800mg④1.96m²以上:2100mg

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	【アロリス】FOLFIRI療法
診療科	腫瘍内科
適応	大腸癌
登録年月日	2022/10/11改訂

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
イリテカン	div	150mg/m ²
レボホリナート	div	200mg/m ²
フルオロウラシル(bolus)	div(全開)	400mg/m ²
フルオロウラシル	civ	2400mg/m ²

投与スケジュール: 2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	アロリス235mg+デキサート4.95mg+グラニセロン3mg	div 30min		●																											
②	イリテカン()mg+5%ブドウ糖 250ml	div 2hr		●																											
③	レボホリナート()mg+5%ブドウ糖 250ml ②と同時に	div 2hr		●																											
④	フルオロウラシル()mg+生食 50ml ②③終了後 bolus	div 全開		●																											
⑤	フルオロウラシル()mg+生食加えて 入院: 全量230ml/外来: トレフューザー全量130ml	civ 46hr		●																											
	デキサメタゾン錠4mg/日 DAY2-4に服用																														

開始予定日 ☐あり 年 月 日 ☐なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	【アロリス】FOLFOX療法
診療科	腫瘍内科
適応	大腸癌
登録年月日	2022/10/11改訂

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オキサリプラチン	div	85mg/m ²
レボホリナート	div	200mg/m ²
フルオロウラシル (bolus)	div (全開)	400mg/m ²
フルオロウラシル	civ	2400mg/m ²

投与スケジュール: 2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	アロリス235mg+デキサート4.95mg+グラニセロン3mg	div 30min		●																											
②	オキサリプラチン()mg+5%ブドウ糖 250ml	div 2hr		●																											
③	レボホリナート()mg+5%ブドウ糖 250ml ②と同時に	div 2hr		●																											
④	フルオロウラシル()mg+生食 50ml ②③終了後 bolus	div 全開		●																											
⑤	フルオロウラシル()mg+生食加えて 入院: 全量230ml/外来: トレフューザー全量130ml	civ 46hr		●																											
	デカトロン錠4mg/日 DAY2-4に服用																														

開始予定日 ☐あり 年 月 日 ☐なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	【アロリス】BEV＋FOLFOX療法
診療科	腫瘍内科
適応	大腸癌
登録年月日	2022/10/11改訂

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オキサリプラチン	div	85mg/m ²
レボホリナート	div	200mg/m ²
フルオロウラシル (bolus)	div (全開)	400mg/m ²
フルオロウラシル	civ	2400mg/m ²
ペバシスマブ	div	5mg/kg

投与スケジュール: 2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	アロリス235mg＋デキサート4.95mg＋グラニセロン3mg	div 30min		●																											
②	ペバシスマブ()mg ＋ 生食 100ml	div 90-30min		●																											
③	生食 50ml	div フラッシュ用		●																											
④	オキサリプラチン()mg＋5%ブドウ糖 250ml	div 2hr		●																											
⑤	レボホリナート()mg＋5%ブドウ糖 250ml ④と同時に	div 2hr		●																											
⑥	フルオロウラシル()mg＋生食 50ml ④⑤終了後 bolus	div 全開		●																											
⑦	フルオロウラシル()mg＋生食加えて 入院: 全量230ml/外来: トレフューザー全量130ml	civ 46hr		●																											
	デカトロン錠4mg/日 DAY2-4に服用																														

開始予定日 ☐あり 年 月 日 ☐なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	【アロカリス】BEV＋FOLFIRI療法
診療科	腫瘍内科
適応	大腸癌
登録年月日	2022/10/11改訂

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
イリリテカン	div	150mg/m ²
レボホリナート	div	200mg/m ²
フルオロウラシル(bolus)	div(全開)	400mg/m ²
フルオロウラシル	civ	2400mg/m ²
ベバシスマブ	div	5mg/kg

投与スケジュール：2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	アロカリス235mg＋デキサート4.95mg＋グラニセロン3mg	div 30min		●																											
②	ベバシスマブ()mg＋生食 100ml	div 90-30min		●																											
③	生食 50ml	div フラッシュ用		●																											
④	イリリテカン()mg＋5%ブドウ糖 250ml	div 2hr		●																											
⑤	レボホリナート()mg＋5%ブドウ糖 250ml ④と同時に	div 2hr		●																											
⑥	フルオロウラシル()mg＋生食 50ml ④⑤終了後 bolus	div 全開		●																											
⑦	フルオロウラシル()mg＋生食加えて 入院：全量230ml/外来：トレフューザー全量130ml	civ 46hr		●																											
	デカトロン錠4mg/日 DAY2-4に服用																														

開始予定日 ☐あり 年 月 日 ☐なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	【アロカリス】アービ`タックス＋FOLFOX
診療科	腫瘍内科
適応	大腸癌
登録年月日	2022/10/11改訂

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
アービタックス(初回)	div(2hr)	400mg/m ²
アービタックス(2回目以降)	div(1hr)	250mg/m ²
オキサリプラチン	div	85mg/m ²
レボ・ホリナート	div	200mg/m ²
フルオロウラシル(bolus)	div(全開)	400mg/m ²
フルオロウラシル	civ	2400mg/m ²

投与スケジュール: 2週毎投与

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	【アロリス】アービタックス(2週毎)+FOLFOX
診療科	腫瘍内科
適応	大腸癌
登録年月日	2022/10/11改訂

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
アービタックス	div (2hr)	500mg/m ²
オキサリプラチン	div	85mg/m2
レボ・ホリナート	div	200mg/m2
フルオロウラシル (bolus)	div (全開)	400mg/m2
フルオロウラシル	civ	2400mg/m2

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	【アロカリス】アービ`タックス＋FOLFIRI
診療科	腫瘍内科
適応	大腸癌
登録年月日	20160414

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
アービタックス(初回)	div(2hr)	400mg/m ²
アービタックス(2回目以降)	div(1hr)	250mg/m ²
イリノテカン	div	150mg/m ²
レボ・ホリナート	div	200mg/m ²
フルオロウラシル(bolus)	div(全開)	400mg/m ²
フルオロウラシル	civ	2400mg/m ²

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	【アロリス】アービ`タックス(2週毎) + FOLFIRI
診療科	腫瘍内科
適応	大腸癌
登録年月日	2022.09.27

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
アービタックス	div(2hr)	500mg/m ²
イリノテカン	div	150mg/m ²
レボホリナート	div	200mg/m ²
フルオロウラシル(bolus)	div(全開)	400mg/m ²
フルオロウラシル	civ	2400mg/m ²

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	【アロリス】ベクティックス＋FOLFOX
診療科	腫瘍内科
適応	大腸癌
登録年月日	2016.06.13(2022.9.1 改訂)

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ベクティックス	div	6mg/kg
オキサリプラチン	div	85mg/m ²
レボホリナート	div	200mg/m ²
フルオロウラシル(bolus)	div(全開)	400mg/m ²
フルオロウラシル	civ	2400mg/m ²

投与スケジュール：2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	アロリス235mg＋デキサート4.95mg＋グラニセロン3mg	div 30min		●																											
②	ベクティックス()mg＋生食 100ml ※Total 100mlにする。	div 1hr		●																											
③	生食 50ml	div フラッシュ用		●																											
④	イリノテカン()mg＋5%ブドウ糖 250ml	div 2hr		●																											
⑤	レボホリナート()mg＋5%ブドウ糖 250ml ⑤と同時に	div 2hr		●																											
⑥	フルオロウラシル()mg＋生食 50ml ⑤⑥終了後 bolus	div 全開		●																											
⑦	フルオロウラシル()mg＋生食加えて 入院：全量230ml/外来：トレフューザー全量130ml	civ 46hr		●																											
⑧	デカトロン錠4mg/日 DAY2-4に服用																														

開始予定日 ☐あり 年 月 日 ☐なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	【アロカリス】ベクティックス＋FOLFIRI
診療科	腫瘍内科
適応	大腸癌
登録年月日	2016.06.13(2022.9.1 改訂)

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ベクティックス	div	6mg/kg
イリノテカン	div	150mg/m ²
レボホリナート	div	200mg/m ²
フルオロウラシル(bolus)	div(全開)	400mg/m ²
フルオロウラシル	civ	2400mg/m ²

投与スケジュール：2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	アロカリス235mg＋デキサート4.95mg＋グラニセロン3mg	div 30min		●																											
②	ベクティックス()mg＋生食 100ml ※Total 100mlにする。	div 1hr		●																											
③	生食 50ml	div フラッシュ用		●																											
④	イリノテカン()mg＋5%ブドウ糖 250ml	div 2hr		●																											
⑤	レボホリナート()mg＋5%ブドウ糖 250ml ⑤と同時に	div 2hr		●																											
⑥	フルオロウラシル()mg＋生食 50ml ⑤⑥終了後 bolus	div 全開		●																											
⑦	フルオロウラシル()mg＋生食加えて 入院：全量230ml/外来：トレフューザー全量130ml	civ 46hr		●																											
⑧	デカトロン錠4mg/日 DAY2-4に服用																														

開始予定日 ☐あり 年 月 日 ☐なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	ベクティビックス＋CPT-11
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2016.06.13(2017.07.28改定)

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ベクテビックス	div	6mg/kg
irinotecan	div	150mg/m ²

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	ベクティビックス単剤
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2016.06.13

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ヘクティックス	div	6mg/kg

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	【アロリス】FOLFOXIRI
診療科	腫瘍内科
適応	大腸癌
登録年月日	2016.12.1

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オキサリプラチン	div	85mg/m ²
イリノテカン	div	150mg/m ²
レボ・ホリナート	div	200mg/m ²
フルオロウラシル	civ	2400mg/m ²

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	【アロカリス】FOLFOXIRI+BEV
診療科	腫瘍内科
適応	大腸癌
登録年月日	2016.12.1

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ヘパシス ^{マブ}	div	5mg/kg
オキサリプラチン	div	85mg/m ²
イリノテカン	div	150mg/m ²
レボ ^{ホリ} ナート	div	200mg/m ²
フルオロウラシル	civ	2400mg/m ²

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	5-FU/LV
診療科	消化器内科
適応	大腸がん
登録年月日	2016.09.15

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
レボホリナート	div	200mg/m ²
フルオウラシル(bolus)	div(全開)	400mg/m ²
フルオウラシル	civ	2400mg/m ²

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	BEV+5-FU/LV
診療科	消化器内科
適応	大腸癌
登録年月日	2016.09.15

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ヘパシスマブ	div	5mg/kg
レボホリナート	div	200mg/m ²
フルオロウラシル(bolus)	div(全開)	400mg/m ²
フルオロウラシル	civ	2400mg/m ²

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	アービタックス単剤
診療科	消化器科
適応	大腸がん
登録年月日	20160414

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
アービタックス(初回)	div(2hr)	400mg/m ²
アービタックス(2回目以降)	div(1hr)	250mg/m ²

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	アービタックス単剤(隔週)
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2022/2/25

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
アービタックス	div	500 mg/m ²

投与スケジュール: 2週毎

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	デキサート注(6.6mg)1A+生食100mL	div 30min		●																											
②	ホ'ラミン5mg+生食50mL	div 15min		●																											
③	アービタックス()mg+生食()ml ※Total 250mlにする。	div 2hr		●																											
④	生食 50ml	div フラッシュ用		●																											

開始予定日 ☐あり 年 月 日 ☐なし

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	アービタックス(毎週)+CPT11(2週毎)
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	20160414(20170728改定)

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
アービタックス(初回)	div(2hr)	400mg/m ²
アービタックス(2回目以降)	div(1hr)	250mg/m ²
イリノテカン	div	150mg/m ²

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	IRIS療法
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん、大腸がん
登録年月日	20160613

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
イリノテカン	div	125mg/m ²
S-1	po	40～60mg/回×2

※TS-1投与量表

体表面積	<1.25	1.25~1.5	1.5≤
投与量(1回量)	40mg	50mg	60mg

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	IRIS+BEV療法
診療科	腫瘍内科
適応	転移性大腸がん
登録年月日	2011.03.04 (2017.7.28改定)

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
イリノテカン	div	100mg/m ²
ベバシズマブ	div	5mg/kg
S-1	po	80～120mg/2 ×

※TS-1投与量表

体表面積	<1.25	1.25~1.5	1.5≤
投与量(1回量)	40mg	50mg	60mg

投与スケジュール: 2週毎投与(TS-1は初日より2週間投与)

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	SIRB療法
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2016.09.14(2017.7.28改定)

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
イリノテカン	div	150mg/m ²
ベバシズマブ	div	7.5mg/kg
S-1	po	

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	XELIRI+BEV療法
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2016.07.26

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ベバシズマブ	div	7.5mg/kg
イリノテカン	div	200mg/m ²
カペシタビン	po	1600mg/m ²

			投与スケジュール： 3週間毎投与																												
投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ヘパシスマブ(7.5mg/kg)+生食100mL	div 30min		●																											
②	生食50mL	div		●																											
③	パロ/セトロン0.75mg+デキサート6.6mg	div 30min		●																											
④	イリノテカン(200mg/m ²) + 5%ブドウ糖500mL	div 90min		●																											
⑤	生食50mL	div 15min		●																											
	カペシタビン錠 ()mg	po 分2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
	アプレピタントカプセルセット DAY1-3 デカトロン錠4mg/日 DAY2-4																														

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	UFT/LV+BEV
診療科	消化器内科
適応	大腸がん
登録年月日	R1.7.22

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
UFT	po	300mg/m ² /DAY 分3
LV	po	75mg/DAY 分3
ベバシズマブ	div	5mg/kg

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	TAS102+BEV療法
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2017.10.26

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
TAS-102	po	35mg/m ²
ベバシズマブ	div	5mg/kg

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	パージェタ+ハーセプチン(初回) (大腸がん)
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2022.7.9

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
パージェタ	div	840mg
ハーセプチン	div	8mg/kg

			投与スケジュール:3週間毎投与																												
投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	パージェタ840mg＋生食250mL	div		●																											
		60min																													
②	生食50mL	div		●																											
		30min																													
③	ハーセプチン()mg＋生食250mL	div		●																											
		90min																													

開始予定日 ☐あり 年 月 日 ☐なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	パージェタ+ハーセプチン(2回目以降) (大腸がん)
診療科	腫瘍内科
適応	大腸がん
登録年月日	2022.7.9

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
パージェタ	div	420mg
ハーセプチン	div	6mg/kg

			投与スケジュール:3週間毎投与																												
投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	パージェタ420mg＋生食250mL	div		●																											
		30min																													
②	生食50mL	div		●																											
		フラッシュ																													
③	ハーセプチン()mg＋生食250mL	div		●																											
		30min																													

開始予定日 ☐あり 年 月 日 ☐なし

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	SOX療法(100mg/m2)
診療科	消化器内科
適応	胃がん
登録年月日	20150620

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オキサリプラチン	div	100mg/m ²
S-1	po	※1

※S-1投与量表

体表面積	<1.25	1.25~1.5	1.5≤
投与量(1回量)	40mg	50mg	60mg

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	SOX+トラスツマブ療法
診療科	消化器内科
適応	胃がん
登録年月日	2021.11.18

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
L-OHP	div	130mg/m ²
S-1	po	40～60mg/回×2
トラスツマブ(初回)	div	8mg/kg
トラスツマブ(2回目以降)	div	6mg/kg

S-1投与量

体表面積	<1.25	1.25～1.5	1.5≤
投与量(1回量)	40mg	50mg	60mg

投与スケジュール: 3週毎投与(S-1は初日より2週間投与)

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセロンハック3mg 100mL+デカドロン4.95mg	div 30min		●																											
②	トラスツマブ()mg + 生食 250ml	div ※		●																											
③	生食50mL	div フラッシュ用		●																											
②	オキサリプラチン()mg+ 5%ブドウ糖 500mL	div 2hr		●																											
③	S-1()mg	po		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
	※初回90分、2回目以降30分																														
	アプレピタントカプセルセット DAY1-3 デカドロン錠4mg/日 DAY2-4																														

開始予定日 ☐あり 年 月 日 ☐なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	SP療法
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	2016.06.13

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
S-1	po	80mg/m ² (分2)
シスプラチン	div	60mg/m ²

投与スケジュール： 5週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	～	35
①	パロノセトロン0.75mg+デキサート9.9mg	div 1hr									●																			
②	生食1000mL+硫酸Mg補正液20mL+KCL20mL	div 2hr									●																			
③	20%マンニトール300mL	div 45min									●																			
④	シスプラチン 60mg/m ² +生食 500ml	div 2hr									●																			
⑤	生食500mL	div 6hr									●																			
⑥	デキサート注(6.6mg)+生食50ml	div 30min										●	●	●																
⑦	生食1000mL+ソリタT3号 500ml	div 12hr										●	●																	
	S-1 80mg/m ²	po 分2(朝・夕)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					

・アプレピタントカプセル125mg DAY8
80mg DAY9-10 に服用

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	SP+HER療法（アプビタント）
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	20160414

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
S-1	po	80mg/m ² (分2)
シスプラチン	div	60mg/m ²
トラスツズマブ	div	6mg/kg (初回8mg/kg)

			投与スケジュール： 3週毎投与																											
投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	～	35
①	ハロノセトロン0.75mg+デキサート注9.9mg	div 30min		●																										
②	生食1000mL+硫酸Mg補正液20mL+KCL20mL	div 2hr		●																										
③	トラスツス`マブ`（ ）mg＋生食 250mL	div 90min以上		●																										
④	20%マンニトール300mL	div 45min		●																										
⑤	シスプラチン 60mg/m ² ＋生食 500ml	div 2hr		●																										
⑥	生食500mL	div 6hr		●																										
⑦	デキサート注(6.6mg)＋生食50ml	div 30min			●	●	●																							
⑧	生食1000mL+ソリタT3号 500ml	div 12hr			●	●																								
	S-1 80mg/m ²	po 分2(朝・夕)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													

・アプレピタントカプセル125mg DAY1
80mg DAY2-3 に服用

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	SP+HER療法（ホスアプレビタント）
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	20160414

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
S-1	po	80mg/m ² (分2)
シスプラチン	div	60mg/m ²
トラスツズマブ	div	6mg/kg (初回8mg/kg)

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	XP療法
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	20160414

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
カペシタビン	経口	1000mg/m ²
シスプラチン	div	80mg/m ²

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	XP+HER療法(アプレピタント)
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	20160414

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
カペシタビン	po	1000mg/m ²
シスプラチン	div	80mg/m ²
トラスツズマブ	div	6mg/kg (初回8mg/kg)

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	XP+HER療法(ホスアプレビタント)
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	20160414

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
カペシタビン	po	1000mg/m ²
シスプラチン	div	80mg/m ²
トラスツズマブ	div	6mg/kg (初回8mg/kg)

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	FP療法(胃)(アプレピタントver)
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	2016.06.13

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
5-FU	div	800mg/m ²
シスプラチン	div	80mg/m ²

			投与スケジュール： 4週毎投与																												
投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	パロノセトン0.75mg+デキサート9.9mg	div 30min		●																											
①	生食1000mL+ソリタT3 500mL	div 12hr			●	●																									
②	デキサート注(6.6mg)+生食50ml	div 30min			●	●	●	●																							
②	生食1000mL+硫酸Mg20mL+KCL20mL	div 2hr		●																											
③	5-FU()mg+生食250mL	div 24hr		●	●	●	●	●																							
④	20%マンニトール 300mL	div 45min		●																											
⑤	シスプラチン 80mg/m ² +生食 500ml	div 2hr		●																											
⑦	生食500mL(側管から)	div 6hr		●																											
⑧	生食50mL	div 30min							●																						

・アプレピタントカプセル125mg DAY1
80mg DAY2-3 に服用

・アプレピタントカプセル125mg DAY1
80mg DAY2-3 に服用

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	FP療法（胃）（ホスアプレピタントver）
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	2016.06.13

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
5-FU	div	800mg/m ²
シスプラチン	div	80mg/m ²

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	FP+HER療法(胃)(アプレピタント)
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	20160421

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
5-FU	civ	800mg/m ²
シスプラチン	div	80mg/m ²
トラスツズマブ(初回)	div	8mg/kg
トラスツズマブ(2回目以降)	div	6mg/kg

投与スケジュール:3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	パロ/セトロン0.75mg+デキサート9.9mg	div 30min		●																											
②	生食1000mL+硫酸Mg20mL+KCL20mL	div 2hr		●																											
③	トラスツズマブ()mg+生食250mL(2回目以降30分)	div 1.5hr		●																											
④	生食50mL(側管から)	div 15min		●																											
⑤	5-FU()mg+生食250mL	div 24hr		●	●	●	●	●																							
⑥	20%マンニトール 300mL	div 45min		●																											
⑦	シスプラチン()mg+生食500mL(Total 500mL)	div 2hr		●																											
⑧	生食500mL	div 6hr		●																											
⑨	デキサート注6.6mg+生食50mL	div 30min			●	●	●	●																							
⑩	生食1000mL+ソリタT3 500mL	div 12hr			●	●																									
⑪	生食50mL(側管から)	div 30min							●																						

・アプレピタントカプセル125mg DAY1
80mg DAY2-3 に服用

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	CPT-11+CDDP療法
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	2016.07.26

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
イリノテカン	div	70mg/m ²
シスプラチン	div	80mg/m ²

			投与スケジュール： 4週毎投与																												
投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ハ°ロ/セトロン0.75mg+デキサート9.9mg	div 30min		●																											
①	ハ°ロ/セトロン0.75mg+デキサート4.95mg	div 30min																●													
②	イリノテカン()mg+5%ブドウ糖250mL	div 90min		●														●													
③	生食1000mL+硫酸Mg20mL+KCL20mL	div 2hr		●																											
④	20%マンニトール 300mL	div 45min		●																											
⑤	シスプラチン 80mg/m ² + 生食 500ml	div 2hr		●																											
⑥	生食500mL	div 6hr		●																											
⑦	デキサート注(6.6mg) + 生食50ml	div 30min			●	●	●																								
⑨	生食1000mL+ソリタT3 500mL	div 12hr			●	●																									
⑩	生食50mL(側管から)	div 30min					●											●													

ア°レピ°タントカ°セルセット DAY1-3、15-17
デ°カ°ロン錠4mg/日 DAY16-18

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	DCF療法(アプレピタント)
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	2016.10.11

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ドセタキセル	div	75mg/m ²
シスプラチン	div	75mg/m ²
5-FU	div	750mg/m ²

投与スケジュール: 4週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	パロ/セトロン0.75mg+デキサート注9.9mg	div 30min		●																											
①	デキサート注6.6mg+生食100mL(側管から)	div 30min			●	●	●	●																							
②	生食1000mL+ソリタT3 500mL(側管から)	div 12hr			●	●																									
②	生食1000mL+硫酸Mg20mL+KCL20mL	div 2hr		●																											
③	ドセタキセル注+生食250mL	div 1hr		●																											
④	マンニトール300mL	div 45min		●																											
⑤	シスプラチン()mg+生食500mL(Total 500mL)	div 2hr		●																											
⑥	5-FU()mg+生食250mL	div 24hr		●	●	●	●	●																							
⑦	生食500mL(側管から)	div 6hr		●																											
⑧	生食50mL(側管から)	div 6hr							●																						

・アプレピタントカプセル125mg DAY1
80mg DAY2-3 に服用

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	DCF療法(ホスアプレピタント)
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	2016.10.11

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ドセタキセル	div	75mg/m ²
シスプラチン	div	75mg/m ²
5-FU	div	750mg/m ²

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	CPT-11(2週毎)
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	2010.11.25

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
イリノテカン	div	150mg/m2

			投与スケジュール： 2週毎																												
投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセトン3mgパック+デキサート4.95mg	div 30min		●														●													
②	イリノテカン()mg+5%ブドウ糖 250mL	div 1.5hr		●														●													

・アプレピタントカプセル125mg DAY1
80mg DAY2-3 に服用
・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	DTX 単剤(胃)
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	2007.02.05

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
DTX	div	60mg/m ²

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	nab-PTX療法(Weekly)
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	2017.10.2

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
アブラキサン	div	100mg/m ² (注1)

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	アブラキサン療法(260mg/㎡)
診療科	消化器内科
適応	胃がん
登録年月日	2014.11.19

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
アブラキサン	div	260mg/m ² (注1)

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	サイラムザ単剤
診療科	消化器内科
適応	治癒切除不能な進行・再発胃癌
登録年月日	2015.9.18

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
サイラムザ	div	8mg/kg

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	サイラムザ+PTX
診療科	消化器内科
適応	治癒切除不能な進行・再発胃癌
登録年月日	2015.9.18

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
サイラムザ	div	8mg/kg
PTX	div	80mg/m ²

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	サイラムザ+nab-PTX
診療科	腫瘍内科
適応	胃癌
登録年月日	2018.2.9

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
サイラムザ	div	8mg/kg
nab-PTX	div	100mg/m ²

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	Nivo+XELOX療法
診療科	腫瘍内科
適応	HER2陰性治癒切除不能 進行・再発胃癌
登録年月日	2021/12/3

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オプジーボ	div	360 mg
オキサリプラチン	div	130 mg/m ²
カペシタビン	po	1000 mg/m ² /回

			投与スケジュール：3週間毎投与																											
投与順	Rp	経路・時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセロンパック3mg 100mL+デキサート 4.95mg +ホパラミン注5mg	div 15min	●																											
②	生食50mL	フラッシュ用	●																											
③	オプジーボ点滴静注360mg+生食100mL ※0.2又は0.22 μ mのインラインフィルターを使用	div 30min	●																											
④	生食50mL ※初回のみ30分かけて投与 ※2回目以降、フラッシュ用として投与		●																											
⑤	オキサリプラチン()mg+5%ブドウ糖 500ml	div 120min	●																											
⑥	カペシタビン錠300 ()mg	po 分2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														

・アプレピタントカプセルセット (DAY1-3)内服
・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4に服用

開始予定日 ☐あり 年 月 日 ☐なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	Nivo+SOX療法
診療科	腫瘍内科
適応	HER2陰性治癒切除不能 進行・再発胃癌
登録年月日	2021/12/3

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オプジーボ	div	360 mg
オキサリプラチン	div	130 mg/m ²
TS-1	po	40～60 mg/回×2

			投与スケジュール: 3週毎投与(TS-1は初日より2週間投与)																											
投与順	Rp	経路・時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセロンパック3mg 100mL+デキサート 4.95mg+ ホラミン 5mg	div 15min	●																											
②	生食50mL	フラッシュ用	●																											
③	オプジーボ点滴静注360mg+生食100mL ※0.2又は0.22μmのインラインフィルターを使用	div 30min	●																											
④	生食50mL ※初回のみ30分かけて投与 ※2回目以降、フラッシュ用として投与		●																											
⑥	オキサリプラチン()mg+ 5% ブドウ糖500mL	div 2hr	●																											
⑦	TS-1()mg	po	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														

・アプレピタントカプセルセット(DAY1-3)内服
 ・デカドロン錠4mg/日 DAY2-4服用

開始予定日 ☐あり 年 月 日 ☐なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	【アタリス】Nivo+FOLFOX療法
診療科	腫瘍内科
適応	HER2陰性治癒切除不能 進行・再発胃癌
登録年月日	2021/12/3

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ニボルマブ	div	240 mg
オキサリプラチン	div	85 mg/m ²
レボホリナート	div	200 mg/m ²
フルオロウラシル (bolus)	div (全開)	400 mg/m ²
フルオロウラシル	civ	2400 mg/m ²

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	内科 PTX 単剤
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん
登録年月日	2007.05.22

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
パクリタキセル	div	80mg/m ²

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	S-1+DTX(術後補助)
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん術後補助化学療法
登録年月日	2020.3.12

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
DTX	div	40mg/m ²
S-1	po	80.100.120mg/DAY

			投与スケジュール： 3週毎に投与																												
投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
②	デキサート6.6mg+生食100mL	div 30min		●																											
④	ドセタキセル()mg+生食 250ml ※DTXは2コース目より開始し7コース目まで投与	div 1hr		●																											
⑤	S-1()mg	po		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
・DTXは2コースより投与開始し7コース目まで継続 ・S-1は1～7コース目までは14日間投与7日間休薬 ⇒8コース目以降は28日間投与14日間休薬			デキサメタゾン 4mg 2T 2x朝・夕食後は別途処方願います (1日目、2日目服用)																												
手術6週目までに治療開始し、手術1年後まで繰り返す																															

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	GEM 単剤
診療科	腫瘍内科
適応	膵がん
登録年月日	2007.01.31

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ゲムシタビン	div	1000mg/m ²

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	GEM+nab-PTX
診療科	消化器内科
適応	膵がん
登録年月日	2015.6.6

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
GEM	div	1000mg/m ²
nab-PTX	div	125mg/m ²

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	【アロカリス】FOLFIRINOX療法
診療科	腫瘍内科
適応	治癒切除不能な膵癌
登録年月日	2014.06.24(2016.12.1改変)

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オキサリプラチン	div	85mg/m ²
イリノテカン	div	150mg/m ²
レボ・ホリナート	div	200mg/m ²
フルオロウラシル	civ	2400mg/m ²

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	【アロリス】nal-IRI+5-FU/LV
診療科	腫瘍内科
適応	膀胱癌
登録年月日	

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
nal-IRI	div	70mg/m2
レボ・ホリナート	div	200mg/m2
フルオロウラシル	civ	2400mg/m2

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	GEM+S-1療法
診療科	腫瘍内科
適応	膵がん
登録年月日	2007.02.03

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ゲムシタビン	div	1000mg/m ²
S-1	po	80mg/m ²

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	GC療法
診療科	腫瘍内科
適応	胆道がん
登録年月日	20160415

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ゲムシタビン	div	1000mg/m ²
シスプラチン	div	25mg/m ³

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	GS療法(胆道癌)
診療科	腫瘍内科
適応	胆道がん
登録年月日	2018.05.15

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ゲムシタビン	div	1000mg/m ²
S-1	po	60mg/m ²

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	ニボルマブ+FP療法 (アプレビタントver)
診療科	腫瘍内科
適応	食道癌
登録年月日	2022/6/2

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
Nivolumab	div	480 mg/body
5-FU	div	800 mg/m2
シスプラチン	div	80 mg/m2

			投与スケジュール：4週間毎投与																											
投与順	Rp	経路・時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	パロノセトロンパック0.75mg+デキサート9.9mg +ホラミン5mg	div 15min	●																											
②	生食50mL	フラッシュ用	●																											
③	ニボルマブ480mg+生食100mL ※0.2又は0.22μmのインラインフィルターを使用	div 30min	●																											
④	生食50mL	フラッシュ用	●																											
⑤	デキサート注(6.6mg)+生食50ml(側管から)	div 30min		●	●	●	●																							
⑥	生食1000mL+ソリタT3 500mL(側管から)	div 12hr		●	●																									
⑥	生食1000mL+硫酸Mg20mL+KCL20mL	div 2hr	●																											
⑦	5-FU()mg+生食250mL	div 24hr	●	●	●	●	●																							
⑧	20%マンニトール 300mL(側管から)	div 45min	●																											
⑨	シスプラチン 80mg/m ² +生食 250ml(側管から)	div 2hr	●																											
⑩	生食500mL(側管から)	div 6hr	●																											
⑪	生食50mL	div 30min						●																						

・アプレビタントカプセルセットは別途処方

開始予定日 ☐あり 年 月 日 ☐なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	ニボルマブ+FP療法 (ホスアプレピタントver)
診療科	腫瘍内科
適応	食道癌
登録年月日	2022/6/2

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
Nivolumab	div	480 mg/body
5-FU	div	800 mg/m ²
シスプラチン	div	80 mg/m ²

			投与スケジュール:4週間毎投与																											
投与順	Rp	経路・時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	パロ/セトロンパッグ0.75mg+ホパラミン5mg	div 15min	●																											
②	生食50mL	フラッシュ用	●																											
③	ニボルマブ480mg+生食100mL ※0.2又は0.22μmのインラインフィルターを使用	div 30min	●																											
④	生食50mL	フラッシュ用	●																											
⑤	ホスアプレピタント150mg+デキサート9.9mg+生食250mL	div 1hr	●																											
⑤	デキサート注(6.6mg)+生食50ml(側管から)	div 30min		●																										
⑤	デキサート注(13.2mg)+生食50ml(側管から)	div 30min			●	●	●																							
⑥	生食1000mL+ソリタT3 500mL(側管から)	div 12hr		●	●																									
⑦	生食1000mL+硫酸Mg20mL+KCL20mL	div 2hr	●																											
⑧	5-FU()mg+生食250mL	div 24hr	●	●	●	●	●																							
⑨	20%マンニトール 300mL(側管から)	div 45min	●																											
⑩	シスプラチン 80mg/m ² +生食 250ml(側管から)	div 2hr	●																											
⑪	生食500mL(側管から)	div 6hr	●																											
⑫	生食50mL	div 30min						●																						

開始予定日 ☐あり 年 月 日 ☐なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	キイトルーダ®+FP療法 (アプレビタントver)
診療科	腫瘍内科
適応	食道癌
登録年月日	2021/12/3

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
キイトルーダ	div	200 mg/body
5-FU	div	800 mg/m2
シスプラチン	div	80 mg/m2

			投与スケジュール：3週間毎投与																											
投与順	Rp	経路・時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	パロセトロンパック0.75mg+デキサート9.9mg +ホウフミン5mg	div 15min	●																											
②	生食50mL	フラッシュ用	●																											
③	キイトルーダ200mg+生食100mL ※0.2～5μmのインラインフィルターを使用	div 30min	●																											
④	生食50mL	フラッシュ用	●																											
⑤	生食1000mL+ソリタT3 500mL	div 12hr		●	●																									
⑥	デキサート注(6.6mg)+生食50ml	div 30min		●	●	●	●																							
⑥	生食1000mL+硫酸Mg20mL+KCL20mL	div 2hr	●																											
⑦	5-FU()mg+生食250mL	div 24hr	●	●	●	●	●																							
⑧	20%マンニトール 300mL	div 45min	●																											
⑨	シスプラチン 80mg/m ² +生食 250ml	div 2hr	●																											
⑩	生食500mL(側管から)	div 6hr	●																											
⑪	生食50mL	div 30min						●																						

・アプレビタントカプセルセットは別途処方

開始予定日 □あり 年 月 日 □なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	キイトルーダ+FP療法 (ホスアプレピタントver)
診療科	腫瘍内科
適応	食道癌
登録年月日	2021/12/3

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
キイトルーダ	div	200 mg/body
5-FU	div	800 mg/m ²
シスプラチン	div	80 mg/m ²

			投与スケジュール：3週間毎投与																											
投与順	Rp	経路・時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	パロ/セトロンパッグ0.75mg+ホパラミン5mg	div 15min	●																											
②	生食50mL	フラッシュ用	●																											
③	キイトルーダ200mg+生食100mL ※0.2～5μmのインラインフィルターを使用	div 30min	●																											
④	生食50mL	フラッシュ用	●																											
⑤	ホスアプレピタント150mg+デキサート9.9mg+生食250mL	div 1hr	●																											
⑤	生食1000mL+ソリタT3 500mL	div 12hr		●	●																									
⑥	デキサート注(6.6mg)+生食50ml	div 30min		●																										
⑥	デキサート注(13.2mg)+生食50ml	div 30min			●	●	●																							
⑦	生食1000mL+硫酸Mg20mL+KCL20mL	div 2hr	●																											
⑧	5-FU()mg+生食250mL	div 24hr	●	●	●	●	●																							
⑨	20%マンニトール 300mL	div 45min	●																											
⑩	シスプラチン 80mg/m ² +生食 250ml	div 2hr	●																											
⑪	生食500mL(側管から)	div 6hr	●																											
⑫	生食50mL	div 30min						●																						

開始予定日 ☐あり 年 月 日 ☐なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	FP+C-mab(アプレピタント)
診療科	腫瘍内科
適応	頭頸部がん
登録年月日	2018.5.2

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
セツキシマブ(初回)	div	400mg/m ²
セツキシマブ(2回目以降)	div	250mg/m ²
シスプラチン	div	100mg/m ²
5-FU	civ	1000mg/m ²

投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	パロ/セトロン0.75mg+デキサート注9.9mg	div 30min		●																											
	デキサート注6.6mg+生食50mL(側管から)	div 30min			●	●	●				●							●													
	生食1000mL+ソリタT3 500mL(側管から)	div 12hr			●	●																									
	生食1000mL+硫酸Mg20mL+KCL20mL	div 2hr		●																											
	ポララミン5mg+生食50mL	div 15min		●							●							●													
	セツキシマブ()mg+生食250mL(2回目以降1時間)	div 2hr		●							●							●													
	生食50mL	div 30min		●																											
	20%マンニトール 300mL	div 45min		●																											
	シスプラチン()mg+生食500mL(Total 500mL)	div 2hr		●																											
	5-FU()mg+生食250mL	div 24hr		●	●	●	●																								
	生食500mL(側管から)	div 6hr		●																											
	生食50mL(フラッシュ用)	div 15min						●			●							●													

アプレピタントカプセルセット別途処方
(1日目から3日間内服)

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	FP+C-mab(ホスアプレピタント)
診療科	腫瘍内科
適応	頭頸部がん
登録年月日	2018.5.2

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
セツキシマブ(初回)	div	400mg/m ²
セツキシマブ(2回目以降)	div	250mg/m ²
シスプラチン	div	100mg/m ²
5-FU	civ	1000mg/m ²

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	5-FU+CBDCA+Pembro
診療科	腫瘍内科
適応	頭頸部がん
登録年月日	2021.2.15

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ペムブロリズマブ	div	200mg/body
カルボプラチン(AUC=5)	div	5×(Ccr+25)
		Ccr単位: ml/min
フルオロウラシル	div	1000mg/m2

投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ポララミン注5mg+生食50mL	div 15min		●																											
②	生食 50ml(フラッシュ用)	div		●																											
③	キイトルーダ(200mg)+生食 100ml ※0.2~5μmのインラインフィルターを使用	div 30min		●																											
④	生食 50ml(フラッシュ用)	div		●																											
⑤	ハロ/セトロン0.75mg+デキサート注9.9mg	div 30min		●																											
⑥	デキサート注6.6mg+生食50mL	div 30min			●	●	●																								
⑦	カルボプラチン()mg+生食250mL	div 2hr		●																											
⑧	フルオロウラシル()mg+生食250mL	div 24hr		●	●	●	●																								
⑨	生食 50ml(フラッシュ用)	div						●																							

アプレピタントカプセルセットは別途処方
※125mg Day 1に内服

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	アテゾリズマブ+BEV療法
診療科	消化器内科
適応	切除不能な肝細胞がん
登録年月日	2020.11.1

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
Atezolizumab	div	1200mg/body
Bevacizumab	div	15mg/kg(注1)

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	ニボルマブ+イピリムマブ併用療法
診療科	腫瘍内科
適応	悪性黒色腫
登録年月日	2020.09.26

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ニボルマブ	div	80mg
イピリムマブ	div	3mg/kg

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	オブジーボ療法
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん、大腸癌、食道癌、悪性黒色腫
登録年月日	

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オプジーボ	div	240mg

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	オプジーボ療法(4Wq)
診療科	腫瘍内科
適応	胃がん、大腸癌、食道癌、悪性黒色腫
登録年月日	

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
オプジーボ	div	480mg

[illegible]

化学療法プロトコール

登録プロトコル名	キイトルーダ療法
診療科	腫瘍内科
適応	悪性黒色腫、食道、頭頸部、大腸癌
登録年月日	2018.4.1

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
キイトルーダ	div	200mg/body

[illegible]