化学療法プロトコール

登録プロトコール名	FEC100
診療科	外科
適応	乳がん
登録年月日	2007.05.22

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
エピルビシン	div	100mg/m ² (注1)
エンドキサン	div	500mg/m ² (注2)
フルオロウラシル	div	500mg/m ² (注3)

投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	アプレピタントカプセルセット (化学療法当日125mgを③開始60~90分前に服用) (化学療法2・3日目80mgを朝食後に服用)	po		●	●	●																									
②	パロセトン0.75mg+デキサート注(9.9mg)	div 30min		●																											
③	エピルビシン(注1)mg+注射用水 50ml	div 全開		●																											
④	エンドキサン(注2)mg+5-FU(注3)mg+生食 250ml	div 1.5hr		●																											
⑤	生食50mL	フラッシュ		●																											
	デカドロン錠(4) 2T 2× ファモチジン錠(20) 2T 2× メクロプラミド錠(5) 6T 3× 翌日より3日間	po			●	●	●																								
				※1クール21日となります(枠内)																											

開始予定日 あり 年 月 日 なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	FEC75
診療科	外科
適応	乳がん
登録年月日	2007.05.22

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
エピルビシン	div	75mg/m ² (注1)
エンドキサン	div	500mg/m ² (注2)
5-FU	div	500mg/m ² (注3)

投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
①	アプレピタントカプセルセット (化学療法当日125mgを③開始60~90分前に服用) (化学療法2・3日目80mgを朝食後に服用)	po		●	●	●																										
②	パロセトロン0.75mg+デキサート注(9.9mg)	div 30min		●																												
③	エピルビシン(注1)mg+注射用水 50ml	div 全開		●																												
④	エンドキサン(注2)mg+5-FU(注3)mg+生食 250ml	div 1.5hr		●																												
⑤	生食50mL	フラッシュ		●																												
	デカドロン錠(4) 2T 2× ファモチジン錠(20) 2T 2× メクロプラミド錠(5) 6T 3× 翌日より3日間	po			●	●	●																									
			※1クール21日となります(枠内)																													

開始予定日 あり 年 月 日 なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	Dose dense EC療法
診療科	外科
適応	乳がん
登録年月日	2018.7.9

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
エピルビシン	div	90mg/m ² (注1)
エンドキサン	div	600mg/m ² (注2)

投与スケジュール: 2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
①	アプレピタントカプセルセット (化学療法当日125mgを③開始60~90分前に服用) (化学療法2・3日目80mgを朝食後に服用)	po		●	●	●																										
②	パロセトロン0.75mg+デキサート注(9.9mg)	div 30min		●																												
③	エピルビシン(注1)mg+注射用水 50ml	div 15min		●																												
④	エンドキサン(注2)mg+生食 100ml	div 30min		●																												
⑤	生食50mL	フラッシュ		●																												
⑥	ジーラスタ	sc				●																										
	デカドロン錠(0.5) 16T 2× 翌日より3日間	po			●	●	●																									

※1クール14日となります(枠内)

開始予定日 あり 年 月 日 なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	ドセタキセル(DTX)療法3週毎
診療科	外科
適応	乳がん
登録年月日	2007.05.22

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ドセタキセル	div	60mg・70mg/m ² (注1)

投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセトロンバッグ3mg/100ml+ デキサート注(6.6mg)1A	div 30min		●																											
②	ドセタキセル(注1)mg+生食 250ml	iv 1.5hr		●																											
③	デカドロン錠(0.5mg)16T	po 朝			●	●																									
③	デカドロン錠(0.5mg)16T	po 夕		●	●																										
			※1クール21日となります(枠内)																												

開始予定日 あり 年 月 日 なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	ウィークリーパクリタキセル(PTX)
診療科	外科
適応	乳がん
登録年月日	2007.05.22

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
パクリタキセル	div	80,70,60mg/m ² (注1)

投与スケジュール: 3週投与、1週休薬

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	レスタミン錠(10) 5T	po		●							●							●													
②	グラニセトロンバッグ(3mg/100ml)+ ファモチジン(20mg)1A+ デキサート注(6.6mg・3.3mg・1.65mg)	div 30min		●							●							●													
③	パクリタキセル(注1)mg+生食 250ml	div 1.5hr		●							●							●													
			※1クール28日となります(枠内)																												

開始予定日 あり 年 月 日 なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	CMF
診療科	外科
適応	乳がん
登録年月日	2007.05.22

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
メソトレキセート	div	40mg/m ² (注1)
5-FU	div	500mg/m ² (注2)
エンドキサンP	po	100mg/day

投与スケジュール: 2週投薬 2週休薬(全6クール)

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセトンバッグ(3mg/100ml)+ デキサート注(6.6mg)1A	div 30min		●							●																				
②	メソトレキセート(注1)mg+生食 100ml	div 1hr		●							●																				
③	5-FU(注2)mg+生食 100ml	div 1hr		●							●																				
④	エンドキサンP(50mg) 2T 2× 14日間 当日~14日目まで連日経口投与	po		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
⑤	デカドロン錠(0.5mg)16T/2× 翌日から3日間	po			●	●	●					●	●	●																	
			※1クール28日となります(枠内)																												

開始予定日 あり 年 月 日 なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	パクリタキセル(PTX)+アバスタチン
診療科	外科
適応	乳がん
登録年月日	2011.11.11

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
パクリタキセル	div	90mg/m ² (注1)
ペバシズマブ	div	10mg/kg (注2)

投与スケジュール: 28日間

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	レスタミン錠(10) 5T	po		●							●							●													
②	グラニセトロンバッグ(3mg/100ml)+ ファモチジン(20mg) 1A+ デキサート注(6.6mg・3.3mg・1.65mg)	div 30min		●							●							●													
③	パクリタキセル(注1)mg+生食 250ml	div 1.5hr		●							●							●													
④	ペバシズマブ(注2)mg+生食 100ml	div		●														●													

初回90分
2回目60分
3回目以降30分

※1クール28日となります(枠内)

開始予定日 あり 年 月 日 なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	TC療法
診療科	外科
適応	乳がん
登録年月日	2008.9.02

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ドセタキセル	div	60、70、75mg/m ² (注1)
エンドキサン	div	600mg/m ² (注2)

投与スケジュール: 3週毎(4~6コース)

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																			
①	グラニセトンバッグ(3mg/100ml) + デキサート注(6.6mg) 1A	div 30min		●																																														
②	エンドキサン(注2)mg + 生食 100ml	div 1hr		●																																														
③	ドセタキセル(注1)mg + 生食 250ml	div 1hr		●																																														
④	生食50mL	フラッシュ		●																																														
	デカドロン錠(0.5) 16T	po 朝			●	●																																												
	デカドロン錠(0.5) 16T	po 夕		●	●																																													
				※1クール21日となります(枠内)																																														

開始予定日 あり 年 月 日 なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	TCH療法
診療科	外科
適応	乳がん
登録年月日	H29.10.6

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
トラスツズマブ(初回のみ)	div	4mg/kg ^(注1)
トラスツズマブ(2回目以降)	div	2mg/kg ^(注2)
ドセタキセル	div	75mg/m ²
カルボプラチン	div	AUC6

投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ジクロフェナク坐薬(50mg) 1本 初回のみ、トラスツズマブ投与30分前に使用			●																											
②	トラスツズマブ( )+生食250mL ※2回目以降は点滴時間30分で投与	div ※1.5hr以上		●							●								●												
③	アロキシ0.75mg+テキサート4.95mg+生食100mL	div 30min		●																											
④	ドセタキセル( )mg+生食250mL	div 60min		●																											
⑤	カルボプラチン( )mg+生食250mL	div 60min		●																											
			※1クール21日となります(枠内)																												
			アプレピタントカプセルセット(1-3日目服用)別途処方																												

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	ハラヴェン療法
診療科	外科
適応	乳がん
登録年月日	2011.09.29

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ハラヴェン	div	1.4mg/m ² (注1)

投与スケジュール: 21日間

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセトロンバッグ3mg	div 30min		●							●																				
②	ハラヴェン(注1)mg+生食50ml	div 5min		●							●																				
③	生食 20ml (フラッシュ用)	iv 30秒		●							●																				
			※1クール21日となります(枠内)																												

開始予定日 あり 年 月 日 なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	外科 GEM
診療科	外科
適応	乳がん
登録年月日	2013.05.17

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ゲムシタビン	div	1250mg/m ² (注1)

投与スケジュール: 3週毎投薬

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																													
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
①	グラニセトロンバック3mg	div 30min		●																												
②	ゲムシタビン(注1)mg+生食 100ml	div 30min		●																												
			※1クール21日となります(枠内)																													

開始予定日 あり 年 月 日 なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	トラスツズマブ(毎週)
診療科	外科
適応	乳がん
登録年月日	2007.05.22

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
トラスツズマブ(初回のみ)	div	4mg/kg ^(注1)
トラスツズマブ(以降)	div	2mg/kg ^(注2)

投与スケジュール: 週1回投与

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																													
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
①	ジクロフェナク坐薬(50mg) 1本 初回のみ、トラスツズマブ投与30分前に使用																															
②	トラスツズマブ(注1、又は注2)ml+生食 250ml	div 1.5hr以上		●																												
			※1クール7日となります(枠内)																													

開始予定日 あり 年 月 日 なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	トラスツズマブ(3週毎)
診療科	外科
適応	乳がん
登録年月日	2008.04.22

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
トラスツズマブ(初回のみ)	div	8mg/kg ^(注1)
トラスツズマブ(以降)	div	6mg/kg ^(注2)

投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ジクロフェナク坐薬(50mg) 1本 初回のみ、トラスツズマブ投与30分前に使用																														
②	トラスツズマブ(注1、又は注2)ml+生食 250ml	div 1.5hr以上	●																												
			※1クール21日となります(枠内)																												

開始予定日 あり 年 月 日 なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	カドサイラ療法(3週毎)
診療科	外科
適応	乳がん
登録年月日	2014.07.23

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
カドサイラ	div	3.6mg/kg ^(注1)

投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
②	カドサイラ(注1)ml+生食 250ml	div 90min		●																											
	※初回90分、2回目以降は忍容性確認後30分で点滴可		※1クール21日となります(枠内)																												
	※0.2又は0.22µmインラインフィルターを通して投与																														

開始予定日 あり 年 月 日 なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	テセントリク+nab-PTX
診療科	外科
適応	PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌
登録年月日	2020.4.8

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
テセントリク	div	840mg
nab-PTX	div	100mg/m ²

投与スケジュール: 3週投与、1週休薬

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセトンハッグ3mg+テキサート注6.6mg +ポララミン5mg	div 30min		●														●													
①	グラニセトンハッグ3mg+テキサート注6.6mg	div 30min									●																				
②	生食 50mL(フラッシュ用)	div 全開		●														●													
③	テセントリク 840mg+生理食塩水 250mL ※0.2又は0.22 μ mのインラインフィルター使用	div ※		●														●													
④	生食 50mL(フラッシュ用)	div 全開		●														●													
⑤	アブラキサン注(注1)mg+生食 ※インラインフィルター使用しない	div 30min		●							●							●													
⑥	生食 50mL(フラッシュ用)	div 全開		●							●							●													
	※初回60分、2回目以降30分																														

開始予定日 あり 年 月 日 なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	Pembrolizumab+GEM+CBDCA
診療科	外科
適応	進行再発乳がん
登録年月日	2022.1.31

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
Pembrolizumab	div	200mg
GEM	div	1000mg/m ²
CBDCA	div	AUC=2

投与スケジュール: 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ハロノセトロンハック0.75mg(50mL)+ デキサート9.9mg+ポラミン5mg	div 15min		●																											
①	ハロノセトロンハック0.75mg(50mL)+ デキサート9.9mg	div 15min									●																				
②	生食50mL	div フラッシュ		●																											
③	Pembrolizumab 200mg+生食100mL ※0.2~5μmのインラインフィルターを使用	div 30min		●																											
④	生食50mL	div フラッシュ		●																											
⑤	GEM( )mg+生食100mL	div 30min		●							●																				
⑦	CBDCA( )mg+生食 250mL	div 1hr		●							●																				
⑧	生食50ml	div フラッシュ		●							●																				
デカドン錠8mg DAY2-3、DAY9-10別途処方 ※イメントカプセルセット併用する場合(DAY1 DEX4.95mg 経口DEXも4mgへ減量)																															

開始予定日 あり 年 月 日 なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	GEM 単剤(膵癌)
診療科	外科
適応	膵がん
登録年月日	2015.08.13

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ゲムシタビン	div	1000mg/m ²

投与スケジュール: 週1回 3週連続投与 4週目休み

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセトロンバッグ3mg	div 30min		●							●							●													
②	ゲムシタビン( )mg+生食 100ml	div 30min		●							●							●													

※1クール28日となります(枠内)

開始予定日 あり 年 月 日 なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	GEM+nab-PTX
診療科	外科
適応	膺がん
登録年月日	2015.8.24

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
GEM	div	1000mg/m ²
nab-PTX	div	125mg/m ²

投与スケジュール: 3週投与1週休薬

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	アプレピタント0.75mg+デキサート6.6mg+50mL	div 30min		●							●							●													
②	アブラキサン注(注1)mg+生食 <アブラキサン注 1Vあたり生食20mLで溶解>	div 30min		●							●							●													
③	生食50mL	div 15min		●							●							●													
④	ゲムシタビン( )mg+生食100mL	div 30min		●							●							●													
			※1クール28日となります(枠内)																												

開始予定日 あり 年 月 日 なし