化学療法プロトコール

登録プロトコール名	TC 療法
診療科	婦人科
適応	卵巣がん・子宮がん
登録年月日	2007.03.05（2022.6.6改訂）

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	div	175mg/m^2
カルボプラチン（AUC=5）	div	5×（Ccr＋25）
		Ccr単位：ml/min

投与スケジュール：　3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	−1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ0.75mg＋ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注20mg ＋ﾃﾞｷｻｰﾄ注13.2mg＋ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注5mg	div 30min		●																											
②	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ（　　）mg＋生食 500ml	div 3hr		●																											
③	カルボプラチン（　　）mg＋生食 500ml	div 2hr		●																											
	ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙｾｯﾄ別途処方願います。 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ4mgDAY2−4内服別途処方願います。																														

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	TC biweekly 療法
診療科	婦人科
適応	卵巣がん・子宮がん
登録年月日	2007.03.05（2022.6.6改訂）

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
パクリタキセル	div	100mg/m^2
カルボプラチン（AUC=3）	div	3×（Ccr＋25）
		Ccr単位：ml/min

投与スケジュール：　2週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	−1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ3mg＋ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注20mg ＋ﾃﾞｷｻｰﾄ注16.5mg＋ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注5mg	div 30min		●																											
②	パクリタキセル（　　）mg＋生食 250ml	div 2hr		●																											
③	カルボプラチン（　　）mg＋生食 500ml	div 2hr		●																											

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	TC weekly 療法
診療科	婦人科
適応	卵巣がん・子宮がん
登録年月日	2008.06.02（2022.6.6改訂）

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
パクリタキセル	div	70mg/m^2
カルボプラチン（AUC=2）	div	2×（Ccr＋25）
		Ccr単位：ml/min

投与スケジュール：　1クール（28日）：1、8、15day投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ3mg＋ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注20mg ＋ﾃﾞｷｻｰﾄ注16.5mg＋ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注5mg	div / 30min		●							●							●													
②	パクリタキセル（　　）mg＋生食 250ml	div / 1hr		●							●							●													
③	カルボプラチン（　　）mg＋5%ブドウ糖250ml	div / 1hr		●							●							●													
	生食100mL	div / 30min		●							●							●													

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	dose dense TC
診療科	婦人科
適応	卵巣がん・子宮がん
登録年月日	2013.06.27（2022.6.6改定）

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
パクリタキセル	div	80mg/m^2
カルボプラチン（AUC=6）	div	6×（Ccr＋25）
		Ccr単位：ml/min

投与スケジュール：　1クール（21日）

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ0.75mg＋ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注20mg ＋ﾃﾞｷｻｰﾄ注13.2mg＋ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注5mg	div 30min		●																											
①	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ3mg＋ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注20mg ＋ﾃﾞｷｻｰﾄ注13.2mg＋ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注5mg	div 30min									●							●													
②	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ（　　）mg＋生食 250mL	div 1hr		●							●							●													
③	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ（　　）mg＋生食250mL	div 1hr		●																											
④	生食50mL	div ﾌﾗｯｼｭ		●							●							●													
	ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙｾｯﾄ（DAY1-3内服）別途処方願います。 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ4mg（DAY2-4内服）別途処方願います。																														

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	Pac/Carbo/Avastin療法
診療科	婦人科
適応	卵巣がん
登録年月日	2014.11.04（2022.6.6改訂）

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
パクリタキセル	div	175mg/m^2
カルボプラチン（AUC=6）	div	5×（Ccr＋25）
アバスチン	div	15mg/kg

投与スケジュール：　3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	−1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ3mg＋ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注20mg ＋ﾃﾞｷｻｰﾄ注13.2mg＋ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注5mg	div 30分		●																											
②	パクリタキセル（　　）mg＋生食 500ml	div 3時間		●																											
③	カルボプラチン（　　）mg＋生食 500ml	div 2時間		●																											
④	アバスチン（　）mg＋生食　100ml 初回90分、2回目60分、3回目以降30分で投与	div		●																											
⑤	生食　50mL	div 15分		●																											
	ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙｾｯﾄ別途処方願います。 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ4mgDAY2−4内服別途処方願います。																														

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	Pac/Carbo/Avastin療法
診療科	婦人科
適応	卵巣がん
登録年月日	2014.11.04（2022.6.6改訂）

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
パクリタキセル	div	175mg/m^2
カルボプラチン（AUC=6）	div	5×（Ccr＋25）
アバスチン	div	15mg/kg

投与スケジュール：　3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	−1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ0.75mg＋ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注20mg ＋ﾃﾞｷｻｰﾄ注13.2mg＋ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注5mg	div 30分		●																											
②	パクリタキセル（　　）mg＋生食 500ml	div 3時間		●																											
③	カルボプラチン（　　）mg＋生食 500ml	div 2時間		●																											
④	アバスチン（　）mg＋生食　100ml 初回90分、2回目60分、3回目以降30分で投与	div		●																											
⑤	生食　50mL	div 15分		●																											
	ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙｾｯﾄ別途処方願います。 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ4mgDAY2−4内服別途処方願います。																														

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	PTX weekly
診療科	婦人科
適応	卵巣がん・子宮がん
登録年月日	2008.08.18（2022.6.6改訂）

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
パクリタキセル	div	80mg/m^2

投与スケジュール：　1クール（28日）：1、8、15day投与

1日目

投与順	Rp	経路・時間	−1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ3mg＋ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注20mg ＋ﾃﾞｷｻｰﾄ注16.5mg＋ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注5mg	div 30min		●							●							●													
②	パクリタキセル（　　）mg＋生食 250ml	div 1hr		●							●							●													
③	生食 100ml	div 30min		●							●							●													

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	PTX療法(triweekly)
診療科	婦人科
適応	卵巣がん・子宮体がん
登録年月日	2015.12.14（2022.6.6改訂）

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
パクリタキセル	div	210mg/m^2

投与スケジュール：　3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	−1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ3mg＋ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注20mg ＋ﾃﾞｷｻｰﾄ注19.8mg＋ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注5mg	div 30min		●																											
②	パクリタキセル（　　）mg＋生食 500ml	div 3hr		●																											

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	TP療法（PTX3時間）
診療科	婦人科
適応	子宮頚がん
登録年月日	2010.04.12（2022.06.06改定）

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
パクリタキセル	div	175mg/m^2
シスプラチン	div	50mg/m^2

投与スケジュール： 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	−1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ｿﾘﾀT3　1000ml	div / 3.5hr		●																											
①	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ0.75mg＋ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注20mg＋ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注5mg ＋ﾃﾞｷｻｰﾄ注13.2mg（ソリタと同時に側管から開始）	div / 30min		●																											
②	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ（　　）mg＋5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖500ml ※ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ終了後、側管から開始。ｿﾘﾀと同時に終了	div / 3hr		●																											
③	シスプラチン（　　）mg＋生食 500ml ①および②＋③を終了確認後開始	div / 2hr		●																											
④	ソリタT3 1500ml	div / 5hr	●	●	●	●																									
⑤	ﾃﾞｷｻｰﾄ注6.6mg＋生食 100ml	div / 30min			●	●	●																								
	ｲﾒﾝﾄ ｶﾌｪ ｾﾙｾｯﾄ別途処方願います。 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ4mgDAY2−4内服別途処方願います。																														

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	TP療法（24時間）
診療科	婦人科
適応	子宮頚がん・卵巣がん
登録年月日	2009.11.25（2022.6.6改定）

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	div	135mg/m^2
ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	div	50mg/m^2

投与スケジュール： 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注20mg＋ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注5mg＋ﾃﾞｷｻｰﾄ注6.6mg ＋生食100mL	div 30min		●																											
②	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ（　　）mg＋5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖500ml ※250mL×2として12時間交換	div 24hr		●																											
③	ｿﾘﾀT3　1000ml	div 2.5hr		●																											
④	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ0.75mg＋ﾃﾞｷｻｰﾄ注9.9mg ③と同時に開始	div 30min			●	●																									
⑤	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ（　　）mg＋生食 500ml ④終了後開始し、③（ｿﾘﾀT3）と同時に終了	div 2hr			●																										
⑥	ｿﾘﾀT3 1500ml	div 6hr			●	●	●																								
⑦	ﾃﾞｷｻｰﾄ注6.6mg＋生食100ml	div 30min				●	●	●																							
	ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙｾｯﾄ別途処方願います。																														

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	TP+BEV療法（PTX3時間）
診療科	婦人科
適応	子宮頸がん
登録年月日	20160321（2022.6.6改訂）

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
パクリタキセル	div	175mg/m^2
シスプラチン	div	50mg/m^2
ベバシズマブ	div	15mg/kg

投与スケジュール： 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	−1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ｿﾘﾀT3　1000ml	div 3.5hr		●																											
②	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ0.75mg＋ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注20mg＋ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注5mg ＋ﾃﾞｷｻｰﾄ注13.2mg（ソリタと同時に側管から開始）	div 30min		●																											
③	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ（　　）mg＋5%ブドウ糖500ml ※ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ終了後、側管から開始。ｿﾘﾀと同時に終了	div 3hr		●																											
④	シスプラチン（　　）mg＋生食 500ml ①および②＋③を終了確認後開始	div 2hr		●																											
⑤	アバスチン（　）mg＋生食　100ml 初回90分、2回目60分、3回目以降30分で投与	div		●																											
⑥	ソリタT3 1500ml	div 5hr	●	●	●	●																									
⑦	ﾃﾞｷｻｰﾄ注6.6mg＋生食 100ml	div 30min			●	●	●																								
	ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌｾﾙｾｯﾄ別途処方願います。 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ4mgDAY2−4内服別途処方願います。																														

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	TP+BEV療法（24時間）
診療科	婦人科
適応	子宮頸がん
登録年月日	20170321（2022.6.6改訂）

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	div	135mg/m^2
ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	div	50mg/m^2
ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	div	15mg/kg

投与スケジュール： 3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注20mg＋ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注5mg＋ﾃﾞｷｻｰﾄ注6.6mg ＋生食100mL	div 30min		●																											
②	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ（　　）mg＋5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖500ml ※250mL×2として12時間交換	div 24hr		●																											
③	ｿﾘﾀT3　1000ml	div 2.5hr		●																											
④	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ0.75mg＋ﾃﾞｷｻｰﾄ注9.9mg ③と同時に開始	div 30min			●	●																									
⑤	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ（　　）mg＋生食 500ml ④終了後開始し、③（ｿﾘﾀT3）と同時に終了	div 2hr			●																										
⑥	アバスチン（ ）mg＋生食　100ml 初回90分、2回目60分、3回目以降30分で投与	div			●																										
⑦	ソリタT3 1500ml	div 6hr			●	●	●																								
⑧	ﾃﾞｷｻｰﾄ注6.6mg＋生食100ml	div 30min				●	●	●																							
	ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙｾｯﾄ別途処方願います。																														

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	TN療法
診療科	婦人科
適応	子宮頚がん
登録年月日	2018.5.10（2022.6.6改訂）

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
パクリタキセル	div	175mg/m^2
ネダプラチン	div	80mg/m^2

投与スケジュール： 4週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ｿﾙｱｾﾄF 500mL	div / 2hr		●																											
	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ0.75mg＋ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注20mg ＋ﾃﾞｷｻｰﾄ注13.2mg＋ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注5mg	div / 30min		●																											
	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ（ ）mg＋生食500ml￥	div / 3hr		●																											
	ｱｸﾌﾟﾗ（ ）mg＋生食 500ml	div / 2hr		●																											
	ﾌﾛｾﾐﾄﾞ20mg+生食100mL	div / 30min		●																											
	ソリタT3 1000ml	div / 4hr		●	●																										
	ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙｾｯﾄ別途処方願います。 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ4mgDAY2-4内服別途処方願います。																														

開始予定日 □あり ＿＿年＿＿月＿＿日 □なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	wPTX+BEV療法
診療科	婦人科
適応	再発卵巣がん
登録年月日	2018.08.31(2022.6.6)

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
パクリタキセル	div	80mg/m^2
アバスチン	div	15mg/kg

投与スケジュール:　3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ3mg＋ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注20mg ＋ﾃﾞｷｻｰﾄ注16.5mg＋ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注5mg	div 30分		●							●							●													
②	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ(　　)mg＋生食250ml	div 1時間		●							●							●													
③	ｱﾊﾞｽﾁﾝ(　)mg＋生食　100ml 初回90分、2回目60分、3回目以降30分で投与	div		●																											
④	生食　50mL	div フラッシュ		●																											

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	婦人科　DC 療法
診療科	婦人科
適応	卵巣がん・子宮がん
登録年月日	2007.05.22

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ドセタキセル	div	70mg/m^2
カルボプラチン（AUC=5）	div	5×（Ccr＋25）
		Ccr単位：ml/min

※カルボプラチンの上限：750mg/body

投与スケジュール：　3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ3mg＋ﾃﾞｷｻｰﾄ注6.6mg +ファモチジン注20mg　1A	div / 30min		●																											
②	ドセタキセル（　　）mg＋生食 250ml	div / 2hr		●																											
⑤	カルボプラチン（　　）mg＋生食 500ml	div / 2hr		●																											
	ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙｾｯﾄ別途処方願います。 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ4mgDAY2-4内服別途処方願います。																														

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	DC+BEV療法
診療科	婦人科
適応	卵巣がん
登録年月日	2017.12.07

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ドセタキセル	div	75mg/m^2
カルボプラチン（AUC=5）	div	5×（Ccr＋25）
アバスチン	div	15mg/kg

投与スケジュール：　3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	−1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ3mg＋ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注20mg　1A +ﾃﾞｷｻｰﾄ注6.6mg	div 30分		●																											
②	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ（　　）mg＋生食 250ml	div 2時間		●																											
③	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ（　　）mg＋生食 250ml	div 2時間		●																											
④	ｱﾊﾞｽﾁﾝ（　）mg＋生食　100ml 初回90分、2回目60分、3回目以降30分で投与	div		●																											
	ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙｾｯﾄ別途処方願います。 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ4mgDAY2-4内服別途処方願います。																														

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	AP療法
診療科	婦人科
適応	子宮体がん
登録年月日	2017.1.31

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
アドリアシン	div	60mg/m^2
シスプラチン	div	50mg/m^2

投与スケジュール： 3～4週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	−1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ｿﾙｱｾﾄF 1000mL	div 4hr	●																												
①	ｿﾘﾀT3 1000mL	div 2hr		●																											
②	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ 1V＋ﾃﾞｷｻｰﾄ注9.9mg＋生食100mL ①投与中に側注	div 30min		●																											
③	ｱﾄﾞﾘｱｼﾝ(　　)mg＋5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖50mL ①投与中に側注	div 10min		●																											
④	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ(　　)mg＋生食 250mL	div 2hr		●																											
⑤	ｿﾘﾀT3 1500mL	div 4hr		●																											
⑥	ﾃﾞｷｻｰﾄ注6.6mg＋生食100mL	div 30min			●	●	●																								
⑦	ｿﾘﾀT3 1500mL	div 4hr			●	●																									
	ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙｾｯﾄ(DAY1−3)																														

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	ドキシル
診療科	婦人科
適応	卵巣がん
登録年月日	2009.06.19（2021.4改定）

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ﾄﾞｷｼﾙ	div	50mg/m^2

投与スケジュール： 28日毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ﾃﾞｷｻｰﾄ注6.6mg ＋ 生食50mL	div 15min		●																											
②	ﾄﾞｷｼﾙ（　　）mg＋5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖250ml ※ﾄﾞｷｼﾙ 90mg以上ではﾌﾞﾄﾞｳ糖500mLに溶解し120分で投与	div ※90min		●																											
③	5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖100ml	div ﾌﾗｯｼｭ用		●																											
	※ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠 60mg 28日間服用																														

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	ﾄﾞｷｼﾙ+ｱﾊﾞｽﾁﾝ療法
診療科	婦人科
適応	進行再発卵巣がん
登録年月日	2016.02.09（2021.4改定）

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ﾄﾞｷｼﾙ	div	40mg/㎡
ｱﾊﾞｽﾁﾝ	div	10mg/kg

投与スケジュール：　4週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ﾃﾞｷｻｰﾄ注6.6mg+生食50mL	div 15分		●																											
②	ﾄﾞｷｼﾙ　（　　）mg+5%　ﾌﾞﾄﾞｳ糖250mL ※ﾄﾞｷｼﾙ90mg以上の時は500mLに溶解し120分で投与	div ※90分		●																											
③	5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖100ml	div フラッシュ用		●																											
④	生食　50mL	div フラッシュ用 （DAY15は15分）		●														●													
⑤	ｱﾊﾞｽﾁﾝ（10mg/kg）+生食100mL ※初回90分、2回目60分、3回目以降30分で投与	div ※		●														●													
⑥	生食　50mL	div フラッシュ用		●														●													
	※ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠 60mg　28日間服用																														

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	ﾄﾞｷｼﾙ/ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ療法
診療科	婦人科
適応	進行・再発卵巣がん
登録年月日	2014.05.30（2021.4改定）

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ﾄﾞｷｼﾙ	div	30mg/m^2
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ（AUC=5）	div	5×（Ccr＋25）
		Ccr単位：ml/min

※カルボプラチンの上限：750mg/body

投与スケジュール：　3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ｱﾛｷｼ0.75mg＋ﾃﾞｷｻｰﾄ注4.95mg＋生食100mL	div 30min		●																											
②	ﾄﾞｷｼﾙ　（　　）mg＋5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖250mL	div 60min		●																											
③	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ（　　）mg＋生食 250ml	div 60min		●																											
	※ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙｾｯﾄ別途処方願います。 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ4mgDAY2-4内服別途処方願います。																														
	※ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠 60mg　28日間服用																														

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	ﾄﾞｷｼﾙ/ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ/ｱﾊﾞｽﾁﾝ療法
診療科	婦人科
適応	進行・再発卵巣がん
登録年月日	2020.5.18（2021.4改定）

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ﾄﾞｷｼﾙ	div	30mg/m^2
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ（AUC=5）	div	5×（Ccr＋25） Ccr単位：ml/min
ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	div	15mg/kg

※カルボプラチンの上限：750mg/body

投与スケジュール：　3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ｱﾛｷｼ0.75mg＋ﾃﾞｷｻｰﾄ注4.95mg＋生食100mL	div 30min		●																											
②	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ（　　）mg＋生食 250mL	div 60min		●																											
③	5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖　100mL	ﾌﾗｯｼｭ		●																											
④	ﾄﾞｷｼﾙ　（　　）mg＋5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖250mL	div 60min		●																											
⑤	5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖　100mL	ﾌﾗｯｼｭ		●																											
⑥	生食50mL	ﾌﾗｯｼｭ		●								※ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙｾｯﾄ別途処方願います。 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ4mgDAY2-4内服別途処方願います。																			
⑦	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ（　　）mg+生食100mL 初回90分、2回目60分、3回目以降30分で投与	div		●								※ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠 60mg　21日間服用																			
⑥	生食50mL	ﾌﾗｯｼｭ		●																											

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	ﾄﾞｷｼﾙ/ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ療法
診療科	婦人科
適応	進行・再発卵巣がん
登録年月日	2014.05.30（2021.4改定）

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ﾄﾞｷｼﾙ	div	25mg/m^2
ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	div	800mg/m^2

投与スケジュール：　3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ3mg＋ﾃﾞｷｻｰﾄ注6.6mg	div 30min		●							●																				
②	ﾄﾞｷｼﾙ　（　　）mg＋5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖250mL	div 60min		●																											
③	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ（　　）mg＋生食 100ml	div 30min		●							●																				
	※ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠 60mg　28日間服用																														

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	ゲムシタビンweekly
診療科	婦人科
適応	卵巣がん・子宮がん
登録年月日	2008.08.18

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ゲムシタビン	div	1000mg/m^2

投与スケジュール：　1クール（28日）：1、8、15day投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ3mg	div 30min		●							●							●													
②	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ（　　）mg＋生食 100ml	div 30min		●							●							●													
③	ｿﾘﾀT1 200ml	div 1hr		●							●							●													

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	CPT-11 weekly
診療科	婦人科
適応	卵巣がん・子宮がん
登録年月日	2008.09.17

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
イリノテカン	div	100mg/m^2

投与スケジュール：3週連続投与、1週休薬

1日目

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	～	8	～	15	～	22	～	1	～	8	～	15	～
①	ソリタT3 500ml	div / 2hr		●		●		●									
②	グラニセトロンバッグ（3mg）1B	div / 30min		●		●		●									
③	イリノテカン（　　）mg＋生食 500ml	div / 2hr		●		●		●									
④	生食 100ml	div / 30min		●		●		●									

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	ハイカムチン療法
診療科	婦人科
適応	卵巣がん
登録年月日	2011.11.28

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ハイカムチン	div	1.25mg/m^2

投与スケジュール： 3週毎投与

1日目

投与順	Rp	経路・時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセトロンバッグ（3mg）1B＋デキサート6.6mg	div / 30min	●	●	●	●	●																							
②	ハイカムチン（ 1.25mg/m^2 ）mg＋生食 100ml	div / 30min	●	●	●	●	●																							

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	婦人科　ベプシド
診療科	婦人科
適応	卵巣がん
登録年月日	2007.05.22

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ベプシド	div	60～100mg/m^2

投与スケジュール：　5日間連続投与　3週休薬　（1クール 4週間）

投与順	Rp	経路・時間	−1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	グラニセトロンバッグ3mg＋ファモチジン注20mg	div 30min		●	●	●	●	●																							
②	ベプシド（　　）mg＋生食 500ml	div 120min		●	●	●	●	●																							

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	婦人科 DTX-GEM
診療科	婦人科
適応	卵巣がん
登録年月日	2007.05.22(2019.5.8改定)

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
GEM	div	800mg/m^2
DTX	div	60mg/m^2

投与スケジュール:　1クール　28日間

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1日目																															
①	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ3mg+ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg	div 30min		●																											
②	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ(　　)mg＋生食 100ml	div 30min		●																											
8日目																															
①	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ3mg+ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg	div 30min									●																				
②	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ(　　)mg＋生食 250ml	div 1hr									●																				
③	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ(　　)mg＋生食 100ml	div 30min									●																				

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	CBDCA＋VP-16
診療科	婦人科
適応	神経芽腫
登録年月日	2013.06.26

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
カルボプラチン（AUC=5）	div	5×（Ccr＋25）
エトポシド	div	100mg/㎡

投与スケジュール：　3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ（3mg）	div / 30min		●	●	●																									
②	ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞ（　　）mg＋生食 500ml	div / 2hr		●	●	●																									
③	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ（　　）mg＋5% Glu250ml	div / 1hr		●																											
④	ｿﾙｱｾﾄF　1000mL	div / 4hr		●																											
⑤	ｿﾙｱｾﾄF　500mL	div / 2hr			●	●																									

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	ﾊｲｶﾑﾁﾝ/Avastin療法
診療科	婦人科
適応	卵巣がん
登録年月日	2015.02.17

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ハイカムチン	div	1.25mg/㎡
Avastin	div	15mg/kg

投与スケジュール:　3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ3mg+ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg	div 30分		●	●	●	●	●																							
②	ﾊｲｶﾑﾁﾝ(　　)mg+生食100mL	div 30分		●	●	●	●	●																							
③	ｱﾊﾞｽﾁﾝ(　)mg＋生食　100mL	div		●																											
	※初回90分、2回目60分、3回目以降30分で投与																														
④	生食　50mL	div 15分		●																											

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	カルブプラチン単剤療法
診療科	婦人科
適応	卵巣がん
登録年月日	2016.9.02

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
カルボプラチン（AUC=5）	div	5×（Ccr＋25）
		Ccr単位：ml/min

投与スケジュール：　3週毎投与

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾟｯｸ3mg＋ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注20mg　1A +ﾃﾞｷｻｰﾄ注6.6mg　1V	div 30min		●																											
②	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ（　　）mg＋生食 500ml	div 2hr		●																											

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし

化学療法プロトコール

登録プロトコール名	ﾍﾟﾝﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+ﾚﾝﾊﾞﾁﾆﾌﾞ（3週間）
診療科	婦人科
適応	がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌
登録年月日	2022.1.24

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
ﾍﾟﾝﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	div	200mg/body
ﾚﾝﾊﾞﾁﾆﾌﾞ	po	20mg/d

投与スケジュール：　1クール21日

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ポララミン5mg+生食50mL	div 15min		●																											
②	生食50mL （フラッシュ用）	div 15min		●																											
③	キイトルーダ200mg+生食100mL ※0.2～5μmのインラインフィルターを使用	div 30min		●																											
④	生食50mL （フラッシュ用）	div		●																											
	レンビマ錠（　　）mg	po		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

開始予定日　□あり　　年　　月　　日　　□なし